

# Hieracium Pilosella L. und Auricula Lamk. et DC. in den Rheinlanden.

Ergänzung zu »Die rheinischen Hieracien, Vorstudien zur neuen  
Flora der Rheinlande«<sup>1)</sup>.

Von

Prof. Dr. med. **K. Touton** (Wiesbaden).

---

»Grosse Floren erfordern grosse Arten.  
Aber das Studium der Lokalfloren  
gibt die besten Resultate, wenn die  
zahlreichen Formen der Gegend so  
genau und vollständig wie möglich  
unterschieden und beschrieben  
werden, und der einfachste Weg  
ist, jeder derselben einen be-  
sonderen spezifischen Namen zu  
geben.« (Hugo de Vries, Arten und  
Varietäten und ihre Entstehung durch Mutation,  
Berlin 1906, pag. 34.)

## Einleitung.

In meinen »Rheinischen Hieracien« hatte ich die ausführliche Bearbeitung von *Hieracium Pilosella* und *Auricula* auf eine spätere Zeit verschoben, weil ich es für förderlich hielt, die beiden in Aussicht stehenden grossen Veröffentlichungen Zahns in Englers Pflanzenreich und Aschersons und Gräbners Synopsis der mittel-europäischen Flora abzuwarten. Eine gewisse Einheitlichkeit der Gliederung, insbesondere des ausserordentlich komplizierten *H. Pilosella* in diesen für lange Zeit hinaus grundlegenden Werken und meiner lokalfloristischen Arbeit hielt ich zur Vermeidung noch grösserer Schwierigkeiten, zumal für solche, die erst an das Studium dieser schwierigsten Phanerogamengattung herantreten, jedenfalls für zweckmässig.

---

<sup>1)</sup> Diese Jahrbücher, Jahrgang 73—76, 1920—1924, speziell Jahrgang 73, 1920, Seite 44 und 46.



Ich wusste durch mündliche und schriftliche Mitteilungen Zahns, dass er mit der Nägeli-Peterschen Einteilung des *H. Pilosella* in die 21 Subspeziesgruppen oder Greges nicht ganz einverstanden war. Nun liegt seine Arbeit in Englers *Regni vegetabilis Conspectus* seit dem 27. Februar 1923 vor und von der bei Ascherson und Gräbner hat er mir liebenswürdigerweise einen Korrekturabzug zur Verfügung gestellt<sup>1)</sup>. So bin ich nun in der Lage, dazu Stellung zu nehmen und habe die Wahl, ob ich die alte Nägeli-Petersche Einteilung beibehalten oder ob ich Zahns Einteilung meiner Bearbeitung zugrunde legen will.

Der neue an Brenner<sup>2)</sup> angelehnte analytische Schlüssel Zahns in Aschersons und Gräbners Synopsis enthält nur die »wichtigeren Formen«, bringt — wenn auch kurze — Diagnosen der 205 Subspezies und hat ein relativ einfaches Grundprinzip, nämlich das Indument, genauer das quantitative Verhältnis der Behaarung zur Bedrüsung der Hülle, auf dem die »Rassengliederung« in 9 Gruppen aufgebaut ist. Er ist bequem und zur raschen Orientierung sehr angenehm. Die reichhaarigen *Tricholepida* stehen den reichdrüsigen *Adenolepida* gegenüber, erstere mit den 3 Unterabteilungen der *Anadenia*, *Oligadenia* und *Pleiadenia*, letztere mit den 4 Unterabteilungen der *Oligotricha*, *Atricha*, *Macradenia* und *Micradenia*. Leider — und das empfand Zahn nicht am wenigsten — kann der Schlüssel nicht absolut scharf sein wegen der zahlreichen Übergänge. Da er aber in erster Linie zur »Bestimmung« geschaffen ist, so leistet er in diesem Sinne mehr als die 21 Greges Nägeli-Peters und deren nicht analytisch gegliederte, gleichwertige Nebeneinanderstellung. Misslich ist das Ab- und Auseinanderreißen des Varietätenkreises von der typischen Form der elementaren Art oder Subspezies, oder andernfalls das ungerechtfertigte Unterbringen einer Varietät zur Vermeidung dieser Trennung zusammen mit dem Typus unter einer der obigen 7 Unterabteilungen, von der dann die allgemeine, voranstehende Charakteristik nicht mehr für die Varietät passt. Zwei Beispiele: Die ssp. *vulgare* Tausch figuriert mit ihrer Varietät  $\beta$ ) *subvulgare* N. P. unter den *Tricholepida Pleiadenia* und mit ihrer typischen Varietät  $\alpha$ ) *genuinum* N. P. unter der 2. grossen Untergruppe *Adenolepida Oligotricha*. Obwohl nun diese »bis spärlich behaarte« Schuppen haben soll, sind sie in der Diagnose »oft haarlos«. Diese Stücke gehörten dann aber eigentlich zu den *Atricha*. Die bei N. P. als Subvarietät bei *genuinum* stehende Form *pilosum*, wird nur der »mälsig zahlreichen« Haare wegen zu der als Subspezies unter die *Tricholepida* versetzten, früheren var. *subvulgare* gezählt, obwohl sie nicht die bauchige Hülle dieser Pflanze hat. So wird dem analytischen

<sup>1)</sup> Inzwischen auch erschienen.

<sup>2)</sup> Spridda Bidrag till kännedom af Finlands Hieracium-Former. VI. Södfinska Pilosellae (Acta societ. pro Fauna et Flora Fennica 25, Nr. 2). Helsingfors 1903.



Schlüssel zuliebe die bei N.P. einen ganz einheitlichen Eindruck machende ssp. *vulgare* mit ihren Varietäten der *Grex Vulgare* zerrissen und in 2 verschiedene, grössere Gruppen verteilt; die haarlosen Pflanzen müssten aber eigentlich in einer dritten Gruppe, den *Atricha* unterkommen. So ist es auch mit der ssp. *subvirescens* N.P., deren var. *genuinum*, aber nur in ihrer subvar. 1) *pilosum* zu den *Tricholepida* *Pleiadenia* zählt (ebenso wie die ganze var. *chlorophyllum*), deren subvar. 2) und 3) *calvescens* und *epilosum* aber als neue ssp. *subvirescenticeps* bei den *Oligotricha* rangieren und mit der 3. *epilosum* eigentlich zu den *Atricha* gehörte. Auch die Erhöhung einer »Varietät« dem a priori angenommenen Einteilungsprinzip des *Indumentes* zuliebe zur »elementaren Art« oder »Subspezies« ist immerhin anfechtbar. Denn die von der Stammart, dem Hauptrepräsentanten der Subspezies, abgeleiteten Varietäten unterscheiden sich von den Stammarten durch irgend ein einfaches aber auffallendes Merkmal und sind der Stammart der elementaren Art untergeordnet, während die die Kollektivart zusammensetzenden elementaren Arten unabhängig voneinander entstanden gedacht werden, einander gleichgeordnet sind im Rang und sich durch mehr als ein Merkmal, oft durch kleine Unterschiede in fast allen ihren Organen und Eigenschaften voneinander abheben. Zu einer derartigen Rangbewertung fehlen uns freilich vorläufig noch die experimentellen Grundlagen, und die Schwierigkeit, systematische Unterschiede allein auf Grund vergleichender, morphologischer Studien zu beurteilen, sind nicht zu verkennen<sup>1)</sup>. Aber de Vries<sup>2)</sup> erkennt doch die hohe Bedeutung derselben an, wenn er sagt: »Die hauptsächlichsten Beweisgründe für die Deszendenztheorie beruhen allerdings auf den Tatsachen der Morphologie, Systematik, Geographie und Palaeontologie.«

Aus den angeführten Gründen scheint mir gerade für die so ungeheuer kompliziert zusammengesetzte sp. *Pilosella* mit den zahlreichen untergeordneten Formen, mit dem durchgängigen Schwanken, dem ewigen »mehr weniger  $\pm$ « der Merkmale ein analytischer Schlüssel auf Grund eines prinzipiell angenommenen Merkmals, wie das Verhältnis der Haare und Drüsen an der Hülle, ohne gewaltsame, systematische Trennungen und Zusammenordnungen nicht möglich. Wird aber ein solcher Schlüssel z. B. aus Gründen der Gleichförmigkeit der Behandlung des Stoffes in einem grossen Sammelwerk gewissermassen zwangsweise verlangt, so ist in unserem Falle durchaus zuzugeben, dass gerade dieses Merkmal das einzig mögliche ist, um die Hauptgrundlage einer analytischen Gliederung abgeben zu können, und dass es — ich betone dies wiederholt — zu einer raschen Orientierung beim Bestimmen bequem und zweckmässig ist. Nur greift er oft störend in die systematischen

<sup>1)</sup> A. Hugo de Vries, *Arten und Varietäten und ihre Entstehung durch Mutation*, Berlin 1906, pag. 22—24.

<sup>2)</sup> l. c. *ibidem* pag. 55.



Beziehungen ein. Mit diesen allgemeinen Einschränkungen verdient die technische Eingliederung der bei Ascherson und Gräbner sich auf 205 belaufenden Subspezies, die bei Engler 624 betragen, hier aber nur mit Namen und Literaturangaben ohne Diagnosen angeführt sind, durch Zahn die Bezeichnung eines mühevollen Kunstwerkes.

Für die nun folgende Aufstellung der rheinischen *Pilosella*-Formen, bei der es sich keineswegs um einen Schlüssel zu einer möglichst bequemen Bestimmung, sondern in erster Linie um eine phytostatische Aufzählung bereits bekannter und auch neuer Formen als Grundlage für eine spätere Flora der Rheinlande handelt, habe ich die Nägeli-Petersche Einteilung beibehalten, weil nach ihr auch mein ganzes Herbariumsmaterial sowie die Notizen der mir zur Bestimmung und Revision zugesickten, zum grossen Teil jetzt aber nicht in meinem Besitze befindlichen Exsikkaten gruppiert sind. Auch diese Gruppierung hat — dieses Schicksal wird sie bei einer so kompliziert zusammengesetzten Kollektivart mit jeder anderen teilen — ihre Schwächen, sie scheint mir aber für meine Zwecke die praktischere. Die Natur dieser alten und neuen Bastarde mit ihrer vegetativen, apogamischen und geschlechtlichen Fortpflanzung, mit ihren Mutationen apogamisch (Ostenfeld) und geschlechtlich entstandener Art lässt sich eben nicht durch Systeme, künstliche Gruppierungen und analytische Schlüssel meistern. Trotzdem nun Zahn selbst mit grossem Pessimismus sagt, »dass das Studium der sp. *Pilosella* im Detail zu nichts führt, weil keine einzige fixierte Subspezies existiert, sondern alles ineinander fliesst«, und er mir noch kürzlich schrieb: »Jeder *Pilosella*-Stock bildet eben mit dem nächsten ohne weiteres Bastarde«, so haben wir m. E. doch die Verpflichtung, besonders in den kleineren Florengebieten, alle uns begegnenden Formen mit den bereits bekannten zu identifizieren bzw. als neue möglichst genau zu beschreiben. Hugo de Vries, der grosse Entwicklungsbiologe, sagt<sup>1)</sup>: »Grosse Floren erfordern grosse Arten. Aber das Studium der Lokalfloren gibt die besten Resultate, wenn die zahlreichen Formen der Gegend so genau und so vollständig wie möglich unterschieden und beschrieben werden, und der einfachste Weg ist, jeder derselben einen besonderen spezifischen Namen zu geben«. Wir können wohl mit Sicherheit annehmen, dass er dadurch auch Anregungen und Resultate für die von ihm so glänzend geförderte Entwicklungsbiologie erhofft.

Wiesbaden, September 1924.

---

<sup>1)</sup> l. c. pag. 84.



## **Hieracium Pilosella L.**

### **I. Trichoscapum N. P.**

ssp. *trichoscapum* N. P.

var. *genuinum* N. P. **Rheinpfalz:** Forst (Zahn), Dürkheim-Poppental (Zahn, Touton).

var. *orientale* N. P.

subvar. *normale* N. P. **Hessen-Nassau:** Brachfeld über der Bahnstrecke Dotzheim-Chausseehaus (Touton).

### **II. Trichophorum N. P.**

ssp. *trichophorum* N. P. **Rheinpfalz:** Wachenheim (Zahn). **Rheinprovinz:** Winningen: Blumslei (Schlickum).

var. *genuinum* N. P. **Rheinprovinz:** Trassgrube bei Winningen (Schlickum).

subvar. *brevipilum* N. P. **Rheinprovinz:** Kuhberg-Gans bei Kreuznach, Burg Altenahr (Touton), Zollstock, Köln (Schlickum).

var. *sedunense* N. P.

subvar. *pilosum* N. P. **Rheinprovinz:** Kreuznach: Hardt (Touton), Castellaun, beim Bahnhof (Touton), Theresiengrube bei Hermühlheim (Schlickum), Winningen: Bergabhang über Lay (Schlickum), Brodenbach (Schlickum), Kobern (mit kleinerer Hülle, Schlickum), Bahndamm unterhalb Heimbach, Ruhr (Wirtgen). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden: Entenpfuhl-Rabengrund (→ *subvirescens*, Touton).

subvar. *subpilosum* N. P. **Rheinprovinz:** Wiese bei Zollstock, Köln (Schlickum).

ssp. *amphichlorum* N. P.

var. *nova amphichloriforme* Touton. Schuppenränder grün, weniger Drüsen oben. **Rheinpfalz:** Wildensteiner Tal am Donnersberg (Touton). **Hessen-Nassau:** Nassau-Singhofen-Jammertal-Arnstein (Touton).

ssp. *dasycephalum* N. P.

var. *nova setifolium* Touton. Blätter lang- und reichborstig. **Rheinpfalz:** Dürkheim, Poppenthal (Touton).

ssp. *nova sedunensiforme* Touton. Äussere Blätter spatelig länglich, stumpf, innere bis lanzettlich spitzlich, Schuppenrand armflockig, grünlich, Hülle 11—13(—15) mm, Haare oben öfter dunkel, Blattrücken grau bis grünlich-grau, sonst wie *sedunense*. Ginge auch evtl. als Form von *tricholepium*. **Starkenburger:** Bieberer-Wald (Touton). **Rheinhessen:**



Budenheim (Touton). **Rheinprovinz**: Boppard: Viersenweg-Alte Burg (Touton), Münster a. St.-Gans und Rothenfels (an letzterem auch eine kleinköpfige [Hülle 8—9 mm]. Form, Touton). **Hessen-Nassau**: Lorch-Wispertal-Sauertal (Touton).

### III. *Tricholepium* N.P.

ssp. *tricholepium* N.P.

var. *genuinum* N.P. **Nordbaden**: Michelsberg bei Untergrombach (Zahn). **Rheinpfalz**: Wachenheim (Zahn), Deidesheim (Touton). **Rheinhessen**: Mombacher Wald bei der Nothelferkapelle, Ingelheimer Wald, Gaualgesheimer Berg, Hechtsheim-Bodenheim, Oppenheim-Rheindamm, Wendelsheim-Teufelsrutsch (alles Touton). **Starken-burg**: Schwedenschanze bei Kelsterbach (Dürer, Touton). **Rheinprovinz**: Münster a. St.-Niederhausen, Castellaun, Bingerbrück, Langenlonsheim-Laubenheim (Touton), Winnigen: Blumslei, Rote Lei, Bergabhang beim Saumsweg, Kondetal, Wiese bei Mariarod (Schlickum), Hönningen bei Linz (Wirtgen), Niederlahnstein-Allerheiligenberg (Wirtgen), Saffenburg und Altenahr (Wirtgen, Touton), Boppard-Viersenweg-Alte Burg, Schweizertal bei St. Goarshausen (Touton), Kiesgrube und Wiesen bei Sinzig (Touton, Schlickum), Kirschkamper Busch bei Krefeld (Höppner), Stolzenfels (Touton), Brodenbach (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Spitzer Stein und Brachfeld bei Dotzheim, Sonnenberg bei Wiesbaden, Klostermühle bei Wiesbaden, Kiesgruben bei Kurve und Mosbach, Hochheim-Flörsheim, Nassau-Dausenau (alles Touton).

subvar. nova *giganticeps* Touton. Hülle 13—15 mm. **Rheinhessen**: Weinbergsränder Hechtsheim-Bodenheim bei Mainz (Touton). **Rheinprovinz**: Weiler-Münsterer Berg-Bingerbrück (Touton).

subvar. nova *stylosum* Schlickum u. Touton. Blüten alle röhrig mit etwas hervorragenden Griffeln. **Rheinprovinz**: Langenthal bei Winnigen (Schlickum).

var. nova *parviceps* Touton. Hülle 8—10 mm, oft mälsig drüsig und weniger behaart, ganze Pflanze weniger robust, oft von Vulgare-Habitus. **Nordbaden**: Michelsberg bei Untergrombach (Zahn). **Rheinhessen**: Mainz: Bahndämme bei Marienborn, Steinbrüche bei Flonheim, Ingelheimer Wald (alles Touton). **Starken-burg**: Kelsterbach, Bahndamm vom Bahnhof bis zum Turnplatz (Touton). **Rheinprovinz**: Kreuznach: Kauzenberg-Hüffelsheimer Chaussee-Lohrre Mühle, Hardt → Rothenfels-Stegfels-Theodorshalle, Wasserreservoir-Monau-Gans (hier auch eine hohe, sehr schlanke Form mit schmal lanzettlichen, unterseits graugrünen Blättern und ziemlich armflockigem Schuppenrand, gegen var. *subvirescentifolium* Touton),



hungriger Wolf (hier eine kleine 5—8 cm hohe, ganz inalpestreartige Form), Stromberg: oberer Rand des Kalkbruchs, gegen Daxweiler, Gammelshausen gegen Spesenrother Heide, Castellaun: um die Ruine, Lorch-Wispertal-Sauertal, Kiesgrube, Sinzig: Monreal, Felsen unter der Ruine (alles Touton), Niederlahnstein-Allerheiligenberg (Wirtgen), Winnigen: Mariarod, Blumslei und Rote Lei (Schlickum), Kobern: untere Ruine (Wirtgen), Hönningen bei Linz in der Eichhell (in schedis früher ssp. oder var. vulgariforme T., Wirtgen), Daun: Weg nach Mehren (wie vorher, Wirtgen), Straußkühle bei Straberg (wie vorher, Höppner), Lichterkopf bei Horchheim (Wirtgen), Echternacherbrück a. d. Sauer, Südeifel (Wirtgen, in schedis f. gracile), Saarburg bei Trier (Wirtgen), Köln: Zollstock, Kleins Ziegelei und Wiese beim alten Ringofen (Schlickum), Brodenbach (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden, Chausseehaus-Bahnlinie gegen Dotzheim-Klostermühle, Nassau-Dausenau und Singhofen-Jammertal-Arnstein (Touton).

subvar. nova *brevifolium* Touton. Blätter kurz länglich bis oval. **Rheinprovinz**: Kreuznach, Kuhberg-Gans und hungriger Wolf (Touton).

subvar. nova *setosifolium* Touton. Blätter sehr reichlich langborstig behaart (—7 mm). **Rheinprovinz**: Brodenbach (Schlickum).

var. *amaurotrichum* N. P. (und ~). **Rheinpfalz**: Dürkheim-Poppental (hier durch unterseits graugrüne Blätter wie auch sonst öfter gegen subvirescens, Zahn, Touton). **Rheinhausen**: Steinbruch Flonheim; Budenheimer Steinbrüche, Ockenheimer Hörnchen (alles Touton). **Starkenburger**: Kelsterbach: Bahndamm zwischen Bahnhof und Turnplatz (hier Hülle nur 9 mm, Touton). **Rheinprovinz**: Münster a. St.-Niederhausen, Rheingrafenstein-Gans, Rothenfels (Touton), Lärer Lei bei Winnigen, Kondetal (Schlickum), Blumslei (hier gegen subvirescens, Schlickum), Gilsdorf bei Münstereifel (Wirtgen), Saarburg bei Trier (hier auch gegen var. genuinum, Wirtgen). **Hessen-Nassau**: Nassau-Dausenau (Touton).

subvar. nova *subamaurotrichum* Touton. Blattrücken grünlich-grau, schwache Rotstreifung. **Rheinprovinz**: Kirn-Hellberg-Martinstein-Monzingen (Schuppen recht breit, Köpfe melanops-artig, Touton).

var. nova *subvirescentifolium* Touton. Blattrücken graugrün bis grüngrau, Blätter obovat spatelig, spatelig länglich stumpf bis lanzettlich spitzlich, Schuppenränder höchstens reichflockig, grünlich durchscheinend, Hülle auch reicher drüsig auf Kosten der Haare, Behaarung heller oder dunkler. Neigt deutlich gegen subvirescens (cf. dessen ssp. pseudotricholepium Touton) und verdiente wohl eigene Ssp. zu werden neben ssp. polycomum. **Rheinpfalz**: Dürkheim-



Poppental (Touton). **Rheinhessen**: Freiweinhem - Ingelheim - Budenheim - Heidesheim - Mombach, Gaualgesheimer Berg (Blätter besonders breit obovat, Touton). **Rheinprovinz**: Bingerbrück - Heiligenkreuz, Kreuznach: Kuhberg, Langenlonsheimer Wald (Touton), Rothenfels bei Münster a. St. und Norheim → Niederhausen (Touton), Castellaun - Wohnrother Tal - Buch (Blätter bis lanzettlich spitz, Touton), Boppard - Viersenweg (auch mit fast breitlichen Schuppen), Winningen: Bergwiese, Langental, Distelberger Weg, Rote Lei, Hasborn unterhalb der Trassgrube, über Blumslei (in schedis pseudosubvirescens, bei Winningen auch noch eine von mir in schedis als var. oblongifolium bezeichnete Form, Schlickum), Hönningen bei Linz in der Eichhell (Wirtgen), Saffenburg (Wirtgen), Condelswald, Kr. Wittlich und Bengel (Andres), Marienburg bei Alf (Wirtgen), Lehmheide bei Krefeld (Höppner), Köln: Wiese bei Zollstock (in schedis var. obovatifolium Schlickum et Touton, Touton). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden: Kiesgrube bei Dotzheim - Layenkopf, Spitzer Stein bei Dotzheim, Bahnlinie Chausseehaus - Dotzheim, Wispertal bei Lorch, Nassau - Singhofen - Jammertal - Arnstein, Nassau - Dausenau, Hochheim - Flörsheim (alles Touton).

var. *trichophorotropum* Zahn. (Kaum sehr verschieden von ssp. sedunensisforma Touton von Grex Trichophorum). **Rheinprovinz**: Büdesheimer Wald bei Bingerbrück - Münster bei Bingerbrück (Touton), Gans bei Münster a. St. (Touton), Wiese bei Sinzig (Schlickum).

var. nova *sublatiusculum* Touton. Hüllschuppen breitlich, Blätter obovat, stumpf, kurz bis lanzettlich spitzlich, Behaarung hell. **Rheinprovinz**: Boppard - Viersenweg - Alte Burg, Düngerfabrik Bingerbrück, Münster a. St. - Niederhausen (Touton).

var. nova *pachylodipus* Schlickum et Touton in schedis. **Rheinprovinz**: Winningen: Saumsweg (Schlickum).

ssp. *pilinum* N. P. **Hessen-Nassau**: Brachfeld zwischen Dotzheim und Chausseehaus, Nassau - Dausenau (Haare nur grau, nicht ganz schwarz, Touton).

ssp. nova *subangustissimum* Touton. Blätter schmal lanzettlich, Hüllschuppen sehr schmal, mit nur reichflockigem, grünlichem Rand, Stengel reich-, weiss- und langhaarig (—5 mm), Behaarung der Hülle nur mäfsig, dagegen reichlichere und lange Drüsen (tricholepium × *Vulgare angustissimum*?). **Rheinpfalz**: Dürkheim - Poppental (Touton).

var. nova *hypertrichodes* Touton. Schuppen sehr schmal, fast nur behaart, höchstens vereinzelte Drüsen, Rand reichflockig, die lange, feine Spitze filzig. Blätter spatelig länglich, stumpflich bis stumpf, unterseits grünlich-grau bis grau. **Rheinprovinz**: Brodenbach (Schlickum).

ssp. *polycomum* N. P. **Rheinprovinz**: Winningen: Bingsthal (Schlickum).



var. nova *bellidipes* Touton. Blätter bis sehr kurz, obovat, gerundet stumpf, Blattrücken grau bis grünlich-grau. Hülle 10 mm, Haare weiss, Schaft 10—15 cm. **Rheinhessen**: Heidesheimer Höhen (Touton). **Rheinprovinz**: Castellaun: Wiesenrand am Bahnhof (Touton), Köln: Zollstock (ähnlich, Schlickum).

var. nova *subpolycomum* Touton. Hülle von 10 mm an. Üppige, gross- und reichblättrige Rosette, Blätter öfter ± stielartig verschmälert, Haare weiss, die oberen nur am Grunde dunkel, am Schaft 1—2 mm lang. **Rheinhessen**: Nothelferkapelle im Mombacher Wald (hier Blätter kürzer, obovat, Unterseite grau bis grünlich-grau, analog der var. *subvirescentifolium*, zu der diese Stücke auch gestellt werden könnten, besonders zu den in schedis als deren var. *obovatifolium* bezeichneten Form [cf. auch die folgende Subvar.], Touton). **Starkenburg**: Bickenbacher Tanne (Touton). **Rheinprovinz**: Münster a. St.: Gans, Stegfels-Forsthaus (hier Blattrücken weisslich-grau bis weisslich), Norheim gegen Niederhausen (wie bei Mombach, alles Touton), Carolahöhe bei Winnigen (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Spitzer Stein bei Dotzheim (auch dunkelhaarigere Stücke), Hochheim-Flörsheim (hier die kürzesten Blätter, unterseits bis grün-grau, Touton).

subvar. nova *virentidorsum* Touton. Blätter extrem breit obovat und stumpf, Blattrücken bis graulich-grün. Schuppenränder weniger flockig. Richtung → *subvirescens*. **Hessen-Nassau**: Spitzer Stein bei Dotzheim (Touton). — Übergänge der Var. zu dieser Subvar. an allen Standorten.

var. nova *amauriceps* Touton. Hülle meist 10 mm (—11 mm) dunkelgrau, etwas milchig überlaufen, Schuppen spitzen bis schwarz, Behaarung kürzer und zugunsten der Drüsen ärmer. Gleitende Übergänge zu *Vulgare* ssp. *amauron*. Pflanzen meist zierlicher mit *Vulgare*-Habitus. **Rheinprovinz**: Brachhang Stromberg-Daxweiler (Touton), Stromberg-Windesheim (Touton), Waldkönigen bei Daun, vulkanische Eifel (Wirtgen).

ssp. nova *amaurotrichiforme* Touton. Schäfte 1—3—(4), schlank, 15—20(—25—35) cm hoch. Blätter lanzettlich bis länglich lanzettlich, bis länglichelliptisch, spitz bis spitzlich bis stumpflich, hell- bis gelblich-grün. Hülle (9—)10(—12) mm lang, gerundet bis breit gerundet, Schuppen schmal, dunkelgrau bis schwärzlich, schmalrandig bis fast unberandet. Haare der Hülle reichlich, dunkel bis schwarz, 1—2 mm, am Schaft spärlich bis zerstreut, selten mäfsig, 2(—3) mm, dunkel oder doch dunkelfüssig, auf den Blättern bis ziemlich reichlich, steiflich bis borstlich, 3—5 mm lang. Drüsen der Hülle fast 0 bis mäfsig, dann dunkel, lang, am Schaft oben mäfsig bis reichlich, bis zum Grund vereinzelt. Flocken: Hülle, Schaft und Blattrücken grau. letzterer bis grünlich-grau, Schuppenrand ± reichflockig, bis an der



Spitze filzig. Randblüten meist  $\pm$  rotstreifig, öfter stark, selten ungestreift. Läufer sehr verlängert, schlank, öfter verzweigt. **Nördl. Baden:** Leimen (Zahn, Touton). **Rheinpfalz:** Dürkheim-Poppental (Zahn, Touton). **Rheinhessen:** Niederwiesen-Nack-Wendelsheimer Teufelsrutsch (Touton). **Starkenburger:** Kelsterbach, Bahndamm zwischen Bahnhof und Turnplatz (Touton). **Rheinprovinz:** Kreuznach: Kuhberg-Gans, Rothenfels, Bingerbrück-Morgenbachtal, Castellaun gegen Bell-Bucher Strasse, Stromberg-Weinberger Hof (Touton), Boppard: Vierseenweg, Weiler-Münsterer Berg-Bingerbrück, Winningen: Saumsweg (in schedis subamaurotrichum, Schlickum), Saarburg bei Trier, bei der Ruine (Wirtgen), Heimbach, Ruhr (mit unterseits graulich-grünen Blättern und grossblättrigen Läufern, Wirtgen), zwischen Straelen und Lumm (Höppner). **Hessen-Nassau:** Brachfeld bei Dotzheim gegen Chausseehaus nahe der Bahnstrecke, Sonnenberg bei Wiesbaden, Wispertal bei Lorch, Nassau-Dausenau (Touton).

var. nova *gracillimum* Touton. Zierliche Pflanzen. Dünner Schaft und Läufer, kleine Blätter und Rosetten, Hüllen 9 mm, zuletzt zylindrisch gestutzt. Stengelhaare vereinzelt bis fast 0, 1—2 mm, sehr fein, hell, höchstens mit kurzem, dunklem Fuss. **Rheinprovinz:** Kreuznach: Kuhberg-Gans (Touton). **Hessen-Nassau:** Limburg-Eschhofen-Runkel (Touton).

var. nova *subamauriceps* Touton. Der var. subpolycum oder auch amauriceps von ssp. polycum besonders durch die Blattform und stark entwickelte Rosette sehr ähnlich, aber Haare der Hülle dunkel bis schwarz, 2 mm lang, der Schäfte dunkel, dick schwarzfüssig, Drüsen dick, schwarz. Blüten dunkelgelb, äussere stark rotstreifig. **Rheinprovinz:** Stromberg-Dörrebach (Touton).

Anmerkung: Nägeli-Peter haben der ssp. tricholepium eine sehr grosse Variationsbreite zugebilligt, es aber unterlassen, ausser der var. genuinum und amaurotrichum (pag. 188) andere Varietäten aufzustellen. Ich habe nun versucht, aus meinem Material dies zu tun, obwohl sowohl die Grenzen derselben sowie auch der Ssp. der Grex Tricholepium untereinander, insbesondere aber auch diejenigen gegen Grex Subvirescens und Vulgare keineswegs scharf sind. Jedenfalls dominieren die Tricholepia in unserem Gebiete unter den übrigen Ssp.-Gruppen von Pilosella sehr.

#### IV. *Latiusculum* N. P.

[ssp. *oligochaetium* N. P. ~. **Rheinprovinz:** Köln, Sudfriedhof (Schlickum)].

ssp. *latiusculum* N. P.

var. *normale* N. P. **Nordbaden:** Michelsberg bei Untergrombach (Zahn). **Rheinpfalz:** Neustadt, Wachenheim (Zahn), Dürkheim-Poppental (Touton). **Rheinhessen:** Budenheimer Steinbrüche, Not-



helferkapelle im Mombacher Wald, Wendelsheimer Teufelsrutsch (Touton). **Rheinprovinz:** Forsthaus Heiligenkreuz bei Bingerbrück, Rothenfels bei Münster a. St., Windesheim-Stromberg (Touton). **Hessen-Nassau:** Spitzer Stein bei Schierstein (Touton). Die Beflockung der Blattunterseite oft geringer, gegen Grex Vulgare, so auch bei

var. nova *subalbescens* Touton. Hülle 9—10 mm lang, Schuppen breitlich, Schuppenrand mäfsig bis reichflockig. **Rheinhausen:** Steinbruch König in Oppenheim (Touton). **Rheinprovinz:** Kreuznach: Kuhberg-Gans (Touton), Abhang beim Saumweg bei Winnigen (Schlickum), Heimbach, Ruhr (in schedis »griseoalbum«, Wirtgen), Firmenich bei Daun (Wirtgen).

var. nova *macrothecum* Touton. Hülle bis 13 mm lang, sehr breit. **Rheinprovinz:** Köln, Wiese bei Zollstock (Blätter lanzettlich bis länglich oder etwas spatelig länglich-lanzettlich, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Spitzer Stein bei Schierstein (Blätter obovat, sehr stumpf, Touton).

var. nova *nigripilum* Touton. Die spärlichen Hüllenhaare und die ziemlich langen Drüsen schwarz. **Rheinprovinz:** Münster a. St.-Norheim gegen Niederhausen (hier auch eine gegen *subvirescens* gehende Form, Touton).

var. nova *epilosiceps* Touton. Hülle haarlos, Blattunterseite grünlich-grau. **Rheinprovinz:** Laubenheim-Langenlonsheimer Wald (Touton).

var. nova *subtricholepiceps* Touton. Hülle bis 12 mm, sehr breit, bis mäfsig kurzhaarig. **Rheinprovinz:** Boppard-Vierseenweg, Burg Altenahr (Touton), Münstereifel, Nordeifel (Wirtgen).

var. nova *subinalpestre* Touton.  $2\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$  cm hoch, Schuppenrand ziemlich reichflockig. Hülle arm- und kurzdrüsig wie die Kopfstiele, Läufer ganz kurz, dicklich. **Hessen-Nassau:** Wispertal-Sauertal (wohl identisch mit dem von N. P., pag. 164, an der Lurlei angegebenen *inalpestre latisquamum*, Touton).

var. nova *sublatiusculum* Schlickum et Touton. Wie ein vulgare subvulgare mit breit gerundeten, 10—12 mm langen Hüllen, breitlichen bis breiten Schuppen, mäfsig-bis reichflockigen Schuppenrändern und ziemlich reichlicher Hüllenbehaarung. Blätter länglich bis elliptisch stumpf, Blattrücken grünlich-grau bis grau. **Rheinprovinz:** Winnigen: Carolahöhe (Schlickum), Zollstock bei Köln (Schlickum).

ssp. nova *multisquamiforme* Touton. Dem multisquamum sehr ähnlich, aber 3 Schäfte, bis 24 cm hoch, Blätter länglich elliptisch, stumpflich. Hülle 7—9 mm, Blattrücken grau bis weissfilzig. Wie *tricholepium parviceps* mit breitlichen Schuppen. **Rheinprovinz:** Kreuznach: hungriger Wolf (zusammen mit der *inalpestre*-artigen kleinen Form von *tricholepium parviceps*, Touton).



ssp. nova **subtrichophorum** Touton. Schaft 1, 10—15 cm hoch, schlank. Blätter kurz, elliptisch bis obovat,  $\pm$  rund stumpf, grün. Hülle 7—8 mm lang, schmal gerundet, eiförmig. Schuppen breit, grau bis dunkelgrau, hellrandig. Haare an der Hülle reichlich, grau mit schwarzem Fuss,  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  mm lang, am Schaft reichlich, hell mit grauem Fuss, 1—2 mm lang, auf den Blättern reichlich weich, bis 4 mm lang. Drüsen an der Hülle spärlich, fein, am Schaft oben ebenso bis mälsig, bald unter dem Kopf aufhörend, zum Teil winzig. Flocken: Hülle und Schaft grau, Schuppenrand reichflockig. Blattrücken grau bis grünlich-grau. Starke Rotstreifung. Läufer mälsig lang, schlank, ziemlich dicht mit obovaten bis elliptischen Blättern besetzt. **Hessen-Nassau**: Hochheim-Flörsheim (Touton).

Anmerkung: Verbindet deutlich *Grex Trichophorum* mit *Vulgare* und gehört deshalb zu *Grex Latiusculum* (N. P. pag. 140, oben).

## VI. **Pilosella** L.

ssp. **Pilosella** L.

var. *genuinum* N. P. **Rheinprovinz**: Saffenburg (hier auch mit schmalen, filzrandigen Schuppen und langen Drüsen gegen *Vulgare* ssp. *amauron?* Wirtgen), Niederlahnstein-Allerheiligenberg (Wirtgen).

var. *deserti* N. P.  $\rightarrow$  ssp. *vulgare* Tsch. **Rheinprovinz**: Waldkönigen bei Daun (Wirtgen).

var. *marinum* N. P. **Rheinprovinz**: Wiese am Fuss von Olbrück, Hain-Lochmühle (Schlickum).

[ssp. **Pilosella** L.  $\rightarrow$  *Grex Latiusculum* N. P., in sched. **Rheinprovinz**: Höhe westlich Kempenich, Hohe Eifel (Wirtgen)].

## IX. **Melanops** N. P.

ssp. **pseudomelanops** N. P. **Rheinprovinz**: Köln: Zollstock (gegen *trichophorum* bzw. *trichoscapum*, Schäfte 2—3, ziemlich reichlich hellhaarig [bis 5 mm lang], Hüllen breit gestutzt, Schlickum).

ssp. **submelanops** N. P. **Rheinprovinz**: Winnigen, Layer Lei (dem *tricholepium amaurotrichum* sehr nahe, aber Schuppen doch wohl nicht breit genug und Rand zu wenig flockig, Schlickum).

ssp. **pachyanthum** N. P. **Hessen-Nassau**: Dotzheim-Layenkopf, Kastanienpflanzung (Touton).

var. *genuinum* N. P.

subvar. *epilosum* N. P. **Rheinhessen**: Wendelsheim-Niederwiesen-Nack (Touton).



ssp. nova **melanopsioides** Touton. Schäfte 1—2, 20—24 cm hoch, schlank. Blätter dünn, weich, dunkelgrün, länglich lanzettlich, innere lanzettlich, stumpflich oder spitzlich. Hülle 10 mm lang, gerundet. Schuppen schmal, schwarz, hellgrün gerandet. Haare an der Hülle, reichlich bis sehr reichlich, dunkelgrau mit schwarzem Fuss,  $1\frac{1}{2}$  bis 2 mm lang, am Schaft mäfsig, oben etwas reichlicher, dunkel bis schwärzlich, 2—5 mm lang, auf den Blättern mäfsig, 2—5 mm lang. an der Hülle ganz vereinzelt, am Schaft oben spärlich, ca. 2—3 mm. Drüsen unter dem Kopf verschwindend. Flocken: Hülle höchstens mäfsig flockig, Schuppenrand nackt, Schaft und Blattrücken graugrün. Blüten dunkelgelb, äussere stark purpurstreifig. Läufer verlängert, ziemlich dünn, sehr entfernt beblättert, reichhaarig. Deutlich zwischen *Melanops* und *subvirescens*. **Rheinprovinz**: Troisdorf bei Bonn (Höppner).

ssp. nova **subfulviflorum** Touton. Unterschiede von *fulviflorum* N. P.: Blätter lanzettlich, spitz, Hülle bis 14 mm, Schuppen breitlich oder fast breitlich. Schwarze Haare an der Hülle mäfsig, 1—2 mm lang. Dunkle Haare am Schaft mäfsig, bis 4 mm lang. Schwarze Drüsen der Hülle, sehr reichlich, sehr lang, Blattrücken grüngrau. Zwischen *Trichophorum sedunensiforme* und *Subcaulescens extraalpinum*. **Rheinprovinz**: Bingerbrück, Düngerfabrik-Münsterer Wald (Touton).

ssp. nova **sublaticeps** Touton. Schaft 1, 10—20 mm hoch, schlank. Blätter länglich stumpf bis lanzettlich spitzlich, dünn und weich, dunkelgrün. Hülle breit gerundet bis fast gestutzt, 12 mm lang; Schuppen schmal, schwarz, äussere unberandet, innere schmal grünrandig. Haare der Hülle ganz kurz, vereinzelt schwärzlich, am Schaft spärlich bis mäfsig, 2—3 mm lang, dunkelgrau, schwarzfüssig, auf den Blättern mäfsig, weich, 2—4 mm lang. Drüsen sehr reichlich, schwarz, an der Hülle sehr lang, am Schaft oben sehr reichlich, kürzer, bis unten hin spärlich. Flocken der Hülle mäfsig bis ziemlich reichlich, am Schuppenrand von unten fehlend bis fast mäfsig. Schaft oben grauschwarz, unten grünlichgrau. Blattrücken grün, nur mäfsig flockig. Randblüten schwach rotstreifig. Läufer wenig verlängert, schlank. Im Habitus an flagellare erinnernd steht es mit den Einzelmerkmalen zwischen *Subcaulescens* und *Subvirescens* und könnte vielleicht bei *Melanops* eingereiht werden, dessen ssp. *laticeps* es nahe kommt. **Rheinprovinz**: Münster a. St.-Norheim → Niederhausen (Touton).

### X. **Subcaulescens** N. P.

ssp. nova **extraalpinum** Touton. Schäfte (1—)2(—3), schlank, meist an oder etwas über der Basis gabelig, 12—25—30 cm hoch. Blätter hell bis gelblich-grün, lanzettlich bis länglich, spitzlich bis stumpf (die äusseren). Hülle (9—)10(—12) mm, schwarz etwas graulich überlaufen, gerundet, ziemlich breit. Schuppen schmal, graulichschwarz



die äusseren kaum, die inneren schmal grünlich gerandet. Haare an Hülle und Schaft 0, oder an letzterem ganz vereinzelt,  $1-1\frac{1}{2}$  mm, schwarz, auf den Blättern mälsig reichlich, steiflich, 2—4 mm lang, der Grund der Blätter an den Rändern sowie die Läufer sehr dicht und lang weisseidig behaart (—5 mm), daher Pflanze eriopod. Drüsen sehr lang, schwarz, an der Hülle und Schaftspitze sehr reichlich, bis zum Grunde immer noch mälsig. Flocken: Hülle mälsig flockig, Schuppenrand nicht, gegen die Spitze hin reichflockig bis fast filzig, Schaft grau, Blattrücken grünlich-grau, grau bis weisslich-grau (die jüngeren). Blüten dunkelgelb, aussen ziemlich stark rotstreifig. Läufer starr, gerade gestreckt, dicklich bis schlank. **Rheinhessen:** Wendelsheim-Niederwiesen-Nacker Steinbrüche-Teufelsrutsch (Touton). **Rheinprovinz:** Kreuznach: Kuhberg-Gans (Touton). **Hessen-Nassau:** Dotzheim-Kastanienpflanzung-Layenkopf (ohne die sehr langen Drüsen fast noch zu subvulgare striatum, Touton).

var. nova *rosulatifipes* Touton. Stattliche Pflanzen. Gut entwickelte Rosette aus dunkelgrünen, obovaten, stumpfen, unterseits grauen bis weissfilzigen, reich- und langborstlich (—5 mm) behaarten Blättern. Hülle reindrüsig oder auch mit einigen schwarzen Haaren. Läufer verlängert, schlank, nicht starr. **Rheinprovinz:** Kurtscheid (früher in sched. *Latiusculum* ssp. *amaurops* oder *amauriforme latifolium* Schlickum et Touton, Schlickum), Morgenbachtal (hier Hülle 13 mm, Blattrücken filzig), Stromberg-Windesheim und → Daxweiler (Touton), Castellaun → Bell-Bucher Strasse (Touton).

Anmerkung: Von Schlickum auch bei Herrenalb gefunden; früher von mir als *vulgare setosum* → *holadenium* in scheda bezeichnet. Leitet zu *vulgare amauron pilosum* hinüber.

var. nova *megaladeniiforme* Touton. Schäfte 3, 11—16 cm hoch, bis herunter reichdrüsig, haarlos. Hülle 10—11 mm, sehr breit bauchig, fast schwarz. Schuppen etwas breitlich, schmal grünrandig, haarlos, sehr reichdrüsig, Drüsen sehr lang, schwarz, Schuppenrand nackt, nach oben bis mälsig flockig. Blätter gelbgrün, obovat spatelig, rund stumpf, bis höchstens mälsig borstig (5 mm lange Borsten), unterseits graulich-grün bis grünlich-grau. Läuferwerk reich entwickelt, Läufer dick, bis zur doppelten Stengelänge, zum Teil aus den Blattachseln kurz gestielte Köpfe treibend. Blüten hellgelb, schwach rotstreifig. Steht zwischen *amauron* und *subvirescens*. **Hessen-Nassau:** Spitzer Stein bei Dotzheim (Touton).

ssp. nova *variiforme* Touton. Der ssp. *varium* N.P. ähnlich durch schwärzlich und weiss gestreifte Hülle, die lang- und reichdrüsig ist, reichflockige Schuppenränder. Unsere nicht alpinen Pflanzen sehr schlank, bis 32 cm hoch, Blattrücken nur grau bis grünlich-grau. Läufer mittellang, dünn.



var. nova *striatum* Touton. Hülle reindrüsig, Blüten hellgelb, mälsig rotstreifig. **Rheinprovinz**: Capellen - Stolzenfels - Eiserne Hand-Kondetal - Winingen (Touton).

var. nova *subexstriatum* Touton. Hülle mit einigen Haaren, Schaft zerstreut bis mälsig behaart, Blätter länglich, stumpflich, Randblüten nur mit schwachen Spuren von Rotspitzung. **Rheinprovinz**: mit voriger (Touton).

var. nova *subvarium* Touton. Einige dunkle Haare an der Hülle, mälsige Rotstreifung. **Hessen-Nassau**: Dotzheim - Layenkopf-Schierstein (Touton).

ssp. nova *subvariiforme* Touton. Der vorigen ähnlich, Hülle breiter. Schuppen bis sehr schmal. Drüsen sehr lang, einzelne dunkle Haare dazwischen. Schuppenrand unten  $\pm$  nackt, dann  $\pm$  mälsig flockig bis an der Spitze filzig. Blattrücken grauweiss bis weisslich-filzig. Blätter länglich, ziemlich reichhaarig bis borstlich, Haare bis 5 mm lang. Blüten dunkler gelb; Randblüten mälsig rotstreifig. Läufer mittellang, die meisten in blühende Flagellen übergehend, die ziemlich steif nach oben streben. **Rheinprovinz**: Kreuznach - Kauzenberg - Hüffelsheimer Chaussee-Lohrmühle (Touton). **Hessen-Nassau**: Lurlei-Schweizertal (Touton).

Anmerkung: Wie *varium* N.P. die alpinen *Greges Subcaulescens* und *Inalpestre* verbinden, so bilden die beiden letzten Ssp. die Brücke zwischen unserem *extraalpinum* und *inalpestriforme* Zahn.

ssp. nova *pseudacutissimum* Touton. Wie var. *acutissimum* N.P., aber Hülle 10 mm lang, tiefschwarz mit schmalen grünlichen Streifen, die sehr reichlichen, schwarzen Drüsen bis 1 mm lang. Schuppen schmal, schmal grünrandig, sehr feinspitzig. Flocken der Hülle spärlich. **Hessen-Nassau**: Bahnlinie Chausseehaus - Dotzheim, Brachfeld (Touton).

Anmerkung: Die Elementararten dieser *Grex* gehören nach N.P. „grossenteils den bedeutenderen Höhen der mitteleuropäischen Gebirgssysteme“ an, wo sie auf Beziehungen zu *Hoppeanum* bzw. *furcatum* weisen, und wir haben uns deshalb bisher immer gescheut, bei uns vorkommende Formen, auch wenn sie morphologisch eine hohe Übereinstimmung besonders durch die langen Drüsen der schwarzen Köpfe mit breitlichen Schuppen zeigten, dazu zu stellen. Im vorliegenden Fall bleibt garnichts anderes übrig, auch trotz der schmalen Schuppen, die ja bei ssp. *varium* N.P., bei ssp. *subcaulescens*, var. *coloratum*, subvar. *polyadenium*, f. *minoriceps* N.P. und bei subvar. *multifloccum* sowie bei ssp. *globosiceps* N.P. auch vorkommen, die bei noch einigen anderen nur als „fast breitlich“ bezeichnet werden. Wenn wir bedenken, dass ganz nahe bei *extraalpinum* *Saxifraga Alzoon* und *Dianthus caesius* stehen, so wird uns auch dieser subalpine Anklang nicht zu sehr überraschen. Die bei N.P. der *Grex Vulgare* zugeteilte ssp. *amauron*, besonders in ihrer var. *subpilosum*, die den vorliegenden Pflanzen sehr nahe stehen, sollten wir auch besser der *Grex Subcaulescens* angliedern und vielleicht noch andere Formen. Die Grundlagen unserer systematischen Anordnung sind doch morphologischer, nicht geographischer und leider noch nicht biogenetischer Natur.



## XI. **Vulgare** (Tsch.) N. P.

**ssp. rosulatum** N. P. **Rheinhausen:** Budenheimer Steinbrüche und Mombacher Wald bei der Nothelferkapelle (hier die imposantesten Rosetten aus den breitesten ovalen bis obovaten Blättern, Touton). **Rheinprovinz:** Weiler-Münsterer Berg-Bingerbrück, Bingerbrück-Morgenbachtal (Touton), Niederlahnstein-Horchheimer Höhe (Touton), Bonefeld-Kurtscheid und Brodenbach (Schlickum), Dockweiler, Kr. Daun (Wirtgen), Stromberg-Daxweiler, Laubenheim-Langenlonsheimer Wald (Schuppenränder etwas weniger flockig, gegen *subvulgare*, Touton).

var. *nova longiglandulum* Touton. Drüsen lang und recht reichlich. **Rheinprovinz:** Neuerburg bei Niederbreitbach (Schlickum), Stromberg: oberer Rand des Kalkbruchs (hier auch mit einzelnen Haaren an der Hülle, Touton).

var. *nova pilicaule* Touton. **Rheinprovinz:** Kempenich (Wirtgen).

var. *nova subpilosiceps* Touton. Schuppenränder viel weniger flockig, mälsige Menge kurzer,  $\pm$  dunkelfüssiger Haare an der Hülle (ev. *rosulatum*  $\times$  *vulgare pilosum*). **Rheinprovinz:** Kurtscheid-Neuerburg (Schlickum), Windesheim-Stromberg (Touton).

**ssp. parviflorum** N. P. **Starkenburger:** Bickenbacher Tanne (Touton). **Rheinprovinz:** Kreuznach: Hardt-Theodorshalle, Castellaun-Bucher Wald (hier auch mit  $\pm$  grünrandigen, nur an der Spitze flockigen Schuppen, Touton), Kurtscheid-Bonefeld, Wolfenacker (Schlickum), Adenau-Breitscheid (in sched. f. *substriatum* T., Wirtgen), Hönningen bei Linz in der Eichhell (Wirtgen), Hetzhof: Sandsteinfelsen (Andres), Mühlenbusch zwischen Uckrath und Straberg (Höppner), Hand bei Dellbrück und Brodenbach (Schlickum).

var. *nova subminuticeps* Touton. Blätter lanzettlich, spitzlich, Hülle 8 mm, eiförmig, grau, Schuppenrand mälsig-, an der Spitze reichflockig, grünlich durchscheinend. **Hessen-Nassau:** Wiesbaden: Adamstal (Touton).

var. *nova epilosum* Touton. **Rheinprovinz:** Winnigen: Saums-weg (Schlickum), Mariarod bei Winnigen (hier  $\rightarrow$  *tricholepium*, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden, Entenpfuhl-Rabengrund ( $\rightarrow$  *angustius*, Touton).

**ssp. nova parvifloriforme** Touton. Schaft 1(—2), 12—36 cm hoch, dünn. Blätter lanzettlich bis länglich lanzettlich, äussere stumpflich, innere spitzlich bis spitz, graulich-grün. Hülle 7—8 mm, ziemlich breit gerundet. Schuppen schmal, grau, sehr schmal gerandet. Haare der Hülle 0 bis mälsig, hell oder etwas dunkelfüssig, am Schaft zerstreut bis mälsig, (1—)2(—3) mm lang, hell oder graulich, auf den Blättern meist ziemlich reichlich, weich oder etwas borstlich, 1—3 mm lang. Drüsen fein, mittellang oder kurz, an der Hülle mälsig, am Schaft oben



zahlreicher, rasch abnehmend und unten nur noch ganz vereinzelt. Flocken: Hülle grau oder weisslich-grau, Schuppenrand mälsig- bis reichflockig, Schaft grünlich-grau bis grau, Blattrücken grau. Blüten hellgelb, äussere ungestreift oder schwach rotstreifig. Läufer dünn, bis sehr lang, entfernt- und ziemlich kleinblättrig. **Hessen-Nassau:** Weilburger Tal bei Dotzheim und Chausseehaus bei Wiesbaden (Touton).

ssp. *trichocephalum* N. P. (= *impexum* Zahn). **Rheinprovinz:** Münster a. St.-Gans-Rothenfels-Stegfels, Thalböckelheim-Niedertäler Hof (Touton), Winningen: Trassmühle (hier → *subvulgare hirsutum*), Rote Lei, Dazeröth a. d. Wied (hier auch → *vulgare pilosum*, Schlickum), Köln: Zollstock (ebenso, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Bahndamm bei St. Goarshausen, Wiesbaden: Kiesgrube bei Dotzheim (Touton).

var. nova *brevipilum* Touton. **Rheinprovinz:** Winningen: Bahndamm (Schlickum).

var. nova *obscuripilum* Touton. **Rheinprovinz:** Winningen: Wiese beim Bingsthal, oben (Schlickum).

var. nova *pachylodipes* Touton. Haare an dem unteren Teil der Blattränder dicht zusammengedrängt, bis 6 mm lang, weissseidig, Läufer sehr reich weisshaarig. Eriopod. **Rheinprovinz:** Kreuznach, Kuhberg-Gans (Touton).

ssp. *vulgare* Tsch.

var. *genuinum* N. P.

subvar. *subpilosum* N. P. **Nördl. Baden:** Heidelberg, Relais-haus, Gorrheim, Grötzingen (Zahn). **Rheinfalz:** (N. P.) **Rhein-**  
**hessen:** Uhlerborn, Sprendlingen (Touton), Jakobskapelle auf dem Ockenheimer Hörnchen (Touton). **Starkenburg:** Walldorf, neues Wirtshaus beim Hengster (Touton). **Rheinprovinz:** Münster a. St.-Gans und Rothenfels, Kreuznach: Kauzenberg-Lohrer-mühle, Forsthaus Heiligenkreuz bei Bingerbrück und Büdesheimer Wald-Münster, Castellaun-Wohnrother Tal und Bucher Wald (hier → *angustissimum*), → Völkenroth-Bahnhof Castellaun, Castellaun → Bell (→ *subvirescens*), Gammels-hausen-Laubach, Wernerseck, Monreal, Burg Altenahr (alles Touton), Ruine Nürburg bei Adenau, Höhe westlich Kempenich, Ruine Olbrück (alles Wirtgen), Zollstock bei Köln, Südfriedhof Kleins und alte Ziegelei ebenda, Hegerhof-Wolfenacker, Kurtscheid (alles Schlickum), Winningen, Adenau, Brodenbach, Plaidt, Bergfisch-Gladbach (Schlickum), Langer Bruch bei Forsthaus Meisbrück, Daun, Waldkönigen bei Daun, Adenau-Breitscheid (Wirtgen), Felsen bei Bengel (Andres), Hetzhof (Andres), Straukuhle bei Straberg, Mühlenbusch bei Uckrath (Höppner), Kiesgrube bei Sinzig, Dockweiler, Kr. Daun (Wirtgen), Kiesgrube bei Rodenkirchen, Büschel bei Herrenstranden



(Schlickum), Stolzenfels (Touton). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden, Kiesgrube bei Dotzheim - Layenkopf, Weilburger Tal, Dotzheimer Felsen, Mosbacher und Curver Sandgrube, Chausseehaus-Fasanerie (microcephal), Eppstein-Fischbach-Cronberg, Eltville-Hallgarter Zange, Bergen bei Frankfurt a. M., Limburg-Linter und Eschhofen-Runkel (auch  $\rightarrow$  pilosum) Schmidtrödter Wiesen bei Königstein, Nassau-Ems, Mauern an der Chaussee und N-Jammertal-Arnstein, Bahndamm St. Goarshausen, Lurlei (alles Touton, letztere auch A. Schultz).

subvar. *setosum* N. P. **Nördl. Baden**: Weinheim (Touton).

**Rheinpfalz**: Wildensteiner Tal am Donnersberg (Touton).

**Rheinhausen**: Wendelsheim - Niederwiesen - Nack, Ingelheim - Heidesheim - Budenheim, Ockenheimer Hörnchen (Touton).

**Rheinprovinz**: Gans und Rothenfels bei Münster a. St. (Touton), Mühlenbachtal bei Kobern, Waldrand bei Kurtscheid  $\rightarrow$  Bonefeld, Zollstock bei Köln (Schlickum), Stromberg - Daxweiler (Touton), Stromberg, oberer Rand des Kalkbruchs (hier f. valdestriatum, Touton), Winnigen: Rote Lei (hier auch  $\rightarrow$  subvulgare striatum), Blumslei, Kiefernwald auf der Heide, Weisses Kreuz bei Altenahr ( $\rightarrow$  angustissimum, Schlickum), Hetzhof ( $\rightarrow$  subpilosum, Andres), Waldweg bei Lohmar a. d. Agger (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Dotzheim: Weilburger Tal, Königstein: Schmidtrödter Wiesen, Eppstein - Fischbach - Cronberg (Touton), St. Goarshausen - Lurlei (Touton).

subvar. *pilosum* N. P. **Rheinhausen**: Jakobskapelle auf dem Ockenheimer Hörnchen (Touton). **Starkenburger**: Neues Wirtshaus beim Hengster, Walldorf, Bickenbacher Tanne (Touton).

**Rheinprovinz**: Münster a. St.: Gans, Gammelshausen (Touton), Condewald, Kr. Wittlich (Andres), Winnigen: Bingsthal, (hier auch gegen parviflorum), Kondetal, Rote Lei, Heide (hier auch  $\rightarrow$  trichocephalum, sowie gegen tricholepium), Blumslei, Trassgrube, Stolzenfels, Zollstock und alter Ringofen bei Köln, Brodenbach (hier auch  $\rightarrow$  tricholepium), Kobern: Felsen bei der Burg (hier auch  $\rightarrow$  trichocephalum), Strassenrand bei Hegerhof, Wegrund bei Kurtscheid (Schlickum), Boppard: Vierseenweg (Touton), Straukuhle bei Straberg (Höppner), Daun-Mehren (Wirtgen). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden: Fasanerie-Chausseehaus, Forsthaus zwischen Dotzheim und Spitzer Stein, Sonnenberger Steinbrüche, Eppstein - Fischbach - Cronberg, Bahndamm bei St. Goarshausen (Touton), Lurlei (A. Schultz), Limburg-Eschhofen-Runkel (Touton), Nassau-Dausenau (Touton).

subvar. *nova pilosetosum* (Touton). Hülle reichhaarig, weniger drüsig, Blattoberseite borstlich bis borstig, Rotstreifung stark. **Rheinpfalz**: Wildensteiner Tal am Donnersberg (Touton).



**Rheinhausen:** Brachfeld an den Heidesheimer Höhen (Touton).  
**Rheinprovinz:** Stromberg: oberer Rand des Kalkbruchs (Touton),  
 Düngerfabrik Bingerbrück → Morgenbachtal (Touton), Heger-  
 hof, Strassenrand (Schlickum), Winnigen: Blumslei, Trassmühle,  
 Rote Lei, Brodenbach, Kurtscheid (Schlickum). **Hessen-Nassau:**  
 Bahndamm Dotzheim-Wiesbaden (Touton).

— subvar. *exstriatum* N. P. **Rheinprovinz:** Winnigen, Süd-  
 friedhof Köln (Schlickum).

Anmerkung: Ausser den genannten Übergangsformen  
 liegen noch eine ganze Anzahl sowohl zwischen den einzelnen  
 Var. und Ssp. der *Grex Vulgare* als auch denjenigen der anderen  
*Greges*, z. B. *Tricholepium*, *Subvirescens*, *Minuticeps*, meist aber nur  
 in einzelnen Stücken vor.

var. *subvulgare* N. P. (jetzt Ssp. bei Zahn, s. Einleitung).

**Nörtl. Baden:** Waghäusel, Grötzingen (Zahn).

subvar. *striatum* N. P. **Rheinpfalz:** Wildensteiner Tal  
 am Donnersberg (Touton). **Oberhessen:** Nauheim bei Hof  
 Hasselhecke (Dürer). **Rheinhausen:** Budenheimer und Ingel-  
 heimer Steinbrüche und Bahndamm Ingelheim-Heidesheim  
 Flonheimer Steinbruch (Touton). **Rheinprovinz:** Gans bei  
 Münster a. St., Rothenfels, Münster a. St.-Norheim →  
 Niederhausen (Touton), Düngerfabrik Bingerbrück-Münsterer  
 Wald (Touton), Boppard-Vierseenweg (Touton), Castellana-  
 Bucher Wald-Wohnrother Tal (Touton), Meerfeld, vulkanische  
 Eifel, Adenau-Nürburg, Hohe Eifel, Höhe westlich Kempenich,  
 Hohe Eifel (Wirtgen), Wernerseck, Felsen unter der Ruine (Touton),  
 Winnigen: Trassgrube, Heide, Layer Lei, Kondetal (hier  
 gegen *augustissimum*), Brodenbach, Kurtscheid, Altenahr, Köln,  
 Südfriedhof, Kleins Ziegelei und Zollstock (alles Schlickum),  
 Kinderbeuren, Voreifel und Hetzhof (Andres), Reichenstein bei  
 Montjoie, Erddünen bei Sourbrodt, Abenden bei Nideggen, Ruhr  
 (hier auch gegen *subvirescens*, Wirtgen), Troisdorf bei Bonn,  
 Straukhule bei Straberg (Höppner). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden:  
 Sonnenberger Steinbrüche und Höhe nördlich von Sonnenberg,  
 Klostermühle, Chausseehaus, Bingert, Eiserne Hand-Platte-  
 Herreneichen, Bahndamm Dotzheim-Wiesbaden, Spitzer Stein  
 bei Dotzheim, Eppstein-Fischbach-Cronberg, Limburg-Esch-  
 hofen-Runkel, Hochheim-Flörsheim (alles Touton), Nassau-  
 Jammertal-Arnstein (Touton).

subvar. *exstriatum* N. P. **Rheinprovinz:** Niederlahnstein-  
 Horchheimer Höhe (Touton), Winnigen (fast *exstriatum*), Fels  
 beim Distelberger Weg (Schlickum), Westers Wiese, alte  
 Ziegelei beim Südfriedhof Köln (Schlickum). **Hessen-Nassau:**  
 Wiesbaden: Klostermühle, Sonnenberger Steinbrüche und Mos-  
 bacher Kiesgrube (Touton).



subvar. *hirsutum* N. P. -**Rheinpfalz**: Wildensteiner Tal am Donnersberg (Touton). **Rheinprovinz**: Bingerbrück-Morgenbachtal (Touton), Castellaun-Gammelshausen: Chausseeränder (Touton), Bonefeld-Kurtscheid (stark  $\rightarrow$  tricholepium Schlickum), Dazeroth a. d. Wied (Schlickum), f. exstriatum bei Zollstock, Köln (Schlickum), Köln, Südfriedhof ( $\rightarrow$  subvirescens, Schlickum). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden: Mosbach, Kiesgrube, Sonnenberg, Hochheim-Flörsheim, Brachacker (Touton).

subvar. nova *hirsutosetulosum* Touton. Blattoberfläche reichborstig. **Rheinprovinz**: Münster a. St.-Gans (Touton). **Hessen-Nassau**: Schweizertal  $\rightarrow$  Patersberg (Touton),

ssp. *guestphalicum* N. P. Westfalen, Ruhrtal (N. P.).

var. nova *calviscapum* Touton. Blätter lanzettlich bis schmal lanzettlich, hellgelbgrün, Hülle weisslich-grau, ziemlich reichhaarig, Blüten kurz, äussere halbröhrig, tief zerschlitzt, (2) Schäfte haarlos, Läufer verlängert, sehr schlank, mit entfernten, ziemlich grossen Blättern, die nur langsam dekresezieren. **Rheinprovinz**: Winnigen: Heide und oberer Bergrand im Kondetal (Schlickum).

Anmerkung: Dem adenopenes Touton (s. u.) sehr ähnlich, das aber schmale Schuppen hat. Früher ssp. nova inopiglandulum Schlickum et Touton, var. scissiflorum Schlickum et Touton in sched.

ssp. nova *liliputanum* Touton. Schaft 1, 1 $\frac{1}{2}$ —4 cm hoch. Rosette reich- und kurzblättrig. Blätter elliptisch bis länglich, stumpf, etwas mukronat, grün. Hülle 9 mm, etwas in den Schaft verschmälert, schmal gerundet. Schuppen fast sehr schmal, sehr feinspitzig, schmal grünlich gerandet. Haare der Hülle O, des Schaftes O, der Blätter spärlich, (1—)2(—3) cm lang, etwas steiflich. Drüsen sehr fein und kurz, an der Hülle reichlich, am Schaft oben mäfsig, bis herunter vereinzelt. Flocken: Hülle und Schaft grau, letzterer bis weisslich. Schuppenrand mäfsig, an der Spitze reichflockig bis filzig, Flocken sehr fein, fast mehlig. Blüten hellgelb, aussen rotstreifig. Läufer kurz, dicklich. **Hessen-Nassau**: Hanau, »Mississippi« nahe dem Ostbahnhof (Touton).

ssp. nova *brachyadenoxyston* Touton. Schaft 12—20 cm hoch, schlank bis dünn, Blätter lanzettlich bis länglich lanzettlich (äussere auch elliptisch), spitzlich (äussere bis stumpf), mukronat, gelblich-grün bis grün. Hülle 8 $\frac{1}{2}$ —9 mm, schmal gerundet. Schuppen schmal, hellgrau, schmal hellgrünlich bis weisslich gerandet. Haare der Hülle O, des Schaftes O bis zerstreut, 1—2 mm, hell und fein, der Blätter spärlich bis mäfsig, weich, 1—3 mm. Drüsen der Hülle reichlich, kurz, am Schaft oben mäfsig, sehr bald verschwindend, winzig, kaum die Beflockung überragend. Flocken: Hülle hellgrau, Schaft oben weisslich, abwärts grau, Schuppenrand unten  $\pm$  nackt, oben bis mäfsig flockig, Blattrücken weisslich filzig bis grau, die der äusseren Blätter bis grünlich-grau. Blüten sehr hellgelb, äussere ungestreift oder ganz schwach



rotstreifig. Läufer mälsig lang, dünn bis dicklich, kleinblättrig. **Rhein-**  
**hessen:** Alzey - Weinheim (Touton). **Rheinprovinz:** Winnigen: Rote Lei  
(Schlickum). **Hessen-Nassau:** Dotzheim, Kastanienpflanzung gegen Layen-  
kopf (Touton).

var. nova *pilosiceps* Touton. Fein- und ganz kurz- ( $-\frac{1}{2}$  mm)  
aber reichhaarige, hellgrünliche bis weisslich-graue Hülle, Schuppen  
zuweilen mit schwärzlichen Spitzen. Einzelne feinste Drüschchen  
zwischen den Härchen versteckt. **Starkenbourg:** Buchrainweiher bei  
Offenbach (Dürer). **Rheinprovinz:** Winnigen: Bahndamm (Schlickum).

subvar. nova *elliptipus* Touton. Blätter kurz, elliptisch,  
breit elliptisch bis obovat, stumpf, Haare der Hülle sehr reich-  
lich, 1—2 mm lang. Blätter fast reich- und langborstlich (bis  
7 mm). **Starkenbourg:** Fischbachtal bei Neuenkirch im Oden-  
wald (Schlickum).

var. nova *adenopenes* Touton. Schuppen bis sehr schmal.  
Schaft ohne Drüsen und Haare, oder oben diese ganz vereinzelt.  
Hülle mit kaum mälsiger Menge feinsten, kurzer Härchen und  
Drüschchen. **Rheinhausen:** Ingelheim - Heidesheim - Budenheim (Touton).  
**Rheinprovinz:** Stromberg-Schweppenhauser Strasse  $\rightarrow$  Fustenburg  
(Blätter ziemlich klein, unterseits grauweissfilzig, äussere Blüten  
etwas stärker rotstreifig, Touton). **Hessen-Nassau:** mit der Ssp. bei  
Dotzheim (Schuppen sehr schmal, Touton).

var. nova *graciliceps* Touton. Von voriger unterschieden  
durch kleinere, schlanke, fast zylindrische Hüllen, 8(—9) mm lang,  
Haarmangel an Hülle und Schaft, nackte bis flockenarme, grünliche  
Schuppenränder, dunkelgelbe Blüten, stark rotstreifige Randblüten,  
starke, auf die Schuppenspitzen übergehende Rotstreifung. **Rhein-**  
**provinz:** Stromberg-Daxweiler, Brachhang (Touton).

Anmerkung: Die beiden letzten Ssp. stehen dem *guestphalicum*,  
besonders die letztere durch die sehr kurzen und aussergewöhnlich  
spärlichen Drüschchen sehr nahe; sie unterscheiden sich hauptsächlich von  
*guestphalicum* durch die schmalen bis sehr schmalen Schuppen, durch die  
stärker flockige Blattunterseite, sowie durch die viel schwächere Rot-  
streifung. Jedenfalls sind sie mit ssp. *Pilosella* und *inalpestris* bzw.  
*inalpestriforme* gute Vertreter der Gruppe *Micradenia* Brenner. Auch die  
folgende reichdrüsige Form gehört dazu.

ssp. nova *subobscurelliforme* Touton. Dem *subobscurellum* Zahn  
durch die sehr kleinen, aber reichlichen Drüsen nahe. Schuppen fast  
sehr schmal, grünrandig. Dunkelgelbe, aussen stark rotstreifige Rand-  
blüten. Amauronartig. **Rheinprovinz:** Stromberg  $\rightarrow$  Daxweiler, Brach-  
hang (Touton).

ssp. *angustissimum* N. P. **Rheinprovinz:** Winnigen: Rote Lei  $\rightarrow$   
Blumslei, Kondetal, Zollstock bei Köln (alles Schlickum), Erddünen bei  
Sourbrodt (Wirtgen). **Hessen-Nassau:** Limburg-Linter (Hülle 11 mm,  
N. P., pag. 156, Touton).



var. nova *pseudangustissimum* Touton. Hülle bis  $10\frac{1}{2}$  mm lang. Die sehr schmalen Schuppen nur ganz unten grün- und nacktrandig, dann bis gegen die Spitze filzig. Die Unterseite der lanzettlichen, länglichen bis elliptischen und ziemlich kurz obovaten Blätter öfter auch nur graugrünlich, meist aber grauweissfilzig, Blattoberseite  $\pm$  borstig (Herbst?). **Rheinprovinz:** Stromberg  $\rightarrow$  Dörrebach, Geröllböschungen nördlich der Landstrasse (Touton), Kondetal bei Winnigen, Theresiengrube bei Hermühlheim bei Köln (Schlickum).

var. nova *subangustissimum* Touton. Hülle bis 12 mm lang. Allerschmalste, feinst gespitzte Schuppen, Blattrücken grau bis grünlich-grau. Einzelne Haare an Hülle und Schaft, kurz und fein, oder auch fehlend. **Rheinprovinz:** Kondetal bei Winnigen (Schlickum). **Hessen-Nassau:** Dotzheim-Spitzer Stein und Brachfeld (hier Blätter länglich lanzettlich, stumpf; Schuppenrand grün,  $\pm$  nackt, Blattrücken grau, geht gegen angustius, Hülle und Schaft haarlos, subvar. *epilosum* Touton in sched., Touton), Nassau-Dausenau (Touton).

ssp. *holadenium* N. P. **Rheinprovinz:** Münster a. St.-Rheingrafenstein-Gans, Monreal und Wernerseck: Felsen unter der Ruine (Blattrücken bis grünlich-grau, Schuppen hellgrün gerandet, Touton), Castellaun-Wiesenrand beim Bahnhof ( $\sim$  inalepstriforme Zahn, Touton), Köln: Zollstock ( $\rightarrow$  angustissimum, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Sonnenberg bei Wiesbaden (Touton), Dotzheim, Brachfeld (Touton).

[ssp. nova *holadeniiforme* Schlickum et Touton (in sched.). **Rheinprovinz:** Winnigen: Saumsweg, Köln: Zollstock, Haus Herl bei Köln-Buchheim (Schlickum)].

ssp. *tenuistolonum* N. P. **Rheinhessen:** Wendelsheim-Niederwiesen-Nacker Steinbrüche-Teufelsrutsch (Hülle 13—14 mm, Touton).

var. nova *submelanopsioides* Touton. Blätter länglich bis obovat länglich, stumpf, Hülle 10—11, schwarzgraugrünlich, Schuppenränder grün. Hülle und Schaft bis mäfsig dunkelhaarig. Ginge mit melanopsioides Touton auch zu Grex Melanops. **Rheinprovinz:** Castellaun  $\rightarrow$  Bell, Bucher-Wald (Touton).

ssp. *hololasium* N. P. **Rheinprovinz:** Alter Steinbruch beim Dieblicherberg (Schlickum), Waldränder zwischen Hetzhof und Kinderbeuren (als var. *subhololasium* Touton in scheda, Andres).

ssp. nova *perangustius* Touton. Schäfte 1(—2), 8—12 cm hoch, schlank. Blätter lanzettlich bis länglich lanzettlich, spitzlich bis spitz, grün. Hülle 10 mm lang, gerundet, Schuppen fast sehr schmal bis sehr schmal, sehr feinspitzig, grau, schmal grünrandig. Haare an Hülle und Schaft mäfsig bis reichlich, weiss bis graulich, an ersterer  $\frac{1}{2}$  mm, am Schaft (1—)2 mm lang, fein, auf den Blättern reichlich, weich,



(1—)2 mm lang. Drüsen an der Hülle spärlich bis fast mäfsig, länger oder kürzer, am Schaft oben ziemlich reichlich, abwärts bis zum Grunde noch vereinzelt, kurz und fein. Flocken: Hülle grau, Schuppenrand nackt, gegen die Spitze armflockig, Schaft grau oder grünlich-grau, Blattrücken grünlich-grau oder grau. Randblüten stark rotstreifig. Läufer ziemlich kurz, dicklich, etwas starr, manche als Flagellen mit Knospen- oder abortierten Köpfchen an der Spitze, mit ziemlich dicht stehenden schmal lanzettlichen Blättern. Steht zwischen angustissimum und angustius pilosum. **Rheinprovinz**: Castellaun: Chausseeränder —> Völkenroth — Waldrand bis Bahnhof, Kreuznach: Wasserreservoir-Monau-Gans (Touton). **Hessen-Nassau**: Sonnenberger Steinbrüche bei Wiesbaden (hier bis 5 Schäfte, 30 cm hoch, blühende Flagellen, Schuppen besonders schmal, Touton).

var. nova *kosmion* Touton. Schaft 1, 4—7 cm hoch, Hülle 8 mm lang, Läufer ganz kurz, dicklich. **Rheinprovinz**: Castellaun-Bucher Wald (Touton).

ssp. **amauron** N. P.

var. *normale* N. P. **Rheinprovinz**: Bingerbrück, Düngerfabrik-Tempel (nur Spur Rotstreifung f. subexstriatum in sched. Touton), alte Ziegelei, Zollstock und Kiesgrube bei Rodenkirchen bei Köln (an letzterem Standort eine sehr breit- aber kurzköpfige [7 mm lange Hülle] Form, Schlickum), Kurtscheid-Bonefeld (Schlickum), Mehren bei Daun (Wirtgen). [Zwischen Straelen und Lumm (Höppner)]. **Hessen-Nassau**: Weilburger Tal bei Dotzheim und Dotzheim-Layenkopf-Schierstein, Eppstein-Ölmühle am Bahndamm (Touton), Sonnenberg bei Wiesbaden (hier Hülle 9 mm, Schuppen schmal, Rand nur unten nackt, Touton).

var. *subpilosum* N. P. **Rheinhesen**: Heidesheimer Höhen (Touton). **Starkenburg**: Dornberger Wiesen —> Berkacher Fohlenweide (Touton). **Rheinprovinz**: Boppard-Vierseenweg-alte Burg (Touton), Kurtscheid-Bonefeld, Zollstock bei Köln (Schlickum), Daun, vulkanische Eifel, Höhe nordwestlich von Waldkönigen bei Daun (Wirtgen), Wald bei Honnef a. d. Sieg (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Brachacker zwischen Hochheim und Flörsheim (Touton), Wiesbaden: Clarenthal-Dotzheim, Bergen —> Bischhofsheim (Touton).

subvar. nova *subangustius* Touton. Hülle 9 mm, breit gerundet. Die lanzettlichen bis länglich lanzettlichen Blätter unterseits grünlich-grau. Schuppen schmal mit sehr vereinzelt Haaren. Bis sehr starke Rotstreifung. **Hessen-Nassau**: Niedernhausen-Eppstein, Nassau-Dausenau (Touton), Sonnenberg (Touton).

var. nova *epilosum* Schlickum et Touton. Hülle und Schaft haarlos, Blätter klein, lanzettlich bis länglich lanzettlich. Drüsen



der Hülle sehr reichlich, lang und schwarz, am Schaft oben mälsig, bis zum Grunde zerstreut. Schuppen breitlich, schwarz, schmal grün- und nacktrandig. **Rheinprovinz:** Sandige Wiese bei Zollstock bei Köln (Schlickum).

var. nova *Hollnickense* Touton. Schäfte 1(—2), 10—24 cm hoch, sehr schlank. Blätter kurz, länglich lanzettlich bis lanzettlich, auch länglich spatelig, äussere stumpf bis innere spitz, grün. Hülle (9—)10(—11) mm lang, breit gerundet, Schuppen schmal bis etwas breitlich, schwarz, schmal grünrandig, sehr feinspitzig. Haare an Hülle und Schaft 0, oder an letzterem unten ganz vereinzelt, 1—1½ mm lang, auf den Blättern reichlich, borstlich, bis 4 mm lang, Drüsen an Hülle und Schaft sehr reichlich, unten noch mälsig, schwarz, besonders am Schaft klein. Flocken: Hülle schwarz, grünstreifig, in der Schuppenmitte reichlich, Rand nackt. Schaft oben grauschwarzviolett, nach unten graugrün bis grün, Blattunterseite grau bis grünlich-grau. Blüten sattgelb mit mälsig starker Rotstreifung. Läufer verlängert, dünn, entfernt und klein beblättert. Eine sehr distinkte Form, die auch gut als Ssp. neben *amauron* (→ *subvirescens*) gelten, aber auch zu *Grex Subvirescens* gestellt werden könnte. **Rheinprovinz:** Hunsrück: Wiesenränder bei Hollnick (Touton).

ssp. nova *subamauriforme* Schlickum et Touton. Hohe (16—27 cm), dünnstengelige, klein- (7—9 mm) und dunkelköpfige Pflanzen. Wie ein vulgare *pilosetosum*, aber die wenig zahlreichen, schwärzlichen, schmal- und ± nacktrandigen Schuppen etwas breitlich, stumpflich mit zahlreichen, langen Drüsen zwischen den reichlichen, am Grunde dunklen, bis 2 mm langen Haaren, Blüten hellgelb, nur schwach rotstreifig oder -spitzig. Die schlanken Hüllen gestutzt oder ± kegelförmig in den Schaft verschmälert. Scheint vulgare × *amauron* zu sein. **Rheinprovinz:** Honnef a. d. Sieg, Wald bei Roth (Schlickum).

ssp. *angustus* N. P.

var. *genuinum* N. P.

subvar. *pilosum* N. P. **Nördl. Baden:** Michelsberg (auch gablig, Zahn). **Rheinpfalz:** (C. H. Schultz). **Rheinprovinz:** Kreuznach: Hardt → Rothenfels-Stegfels (mit fast breitlichen Schuppen → *subvirescens*, Touton), Niederlahnstein-Horchheimer Höhe (→ var. *bernhardinum* N. P., Touton), Dazeroth, (→ *trichophorum sedunense pilosum* T. in sched. Schlickum), Köln: Zollstock (Schlickum), Schloss-Thalböckelheim-Niederrätherhof → Niederhausen (hier gegen die folgende, Touton).

subvar. *subpilosum* N. P. **Rheinprovinz:** Kreuznach: Hardt → Rothenfels-Stegfels-Theodorhalle (Touton). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden: Entenpfuhl-Rabengrund (Touton), Brachfeld bei Dotzheim (Touton).



subvar. *epilosum* N. P. **Rheinprovinz**: Münster a. St.-Gans und Rothenfels (Touton), Castellaun-Bucher Wald (Touton), Boppard-Vierseenplatz-Gideonshöhe-Alte Burg (Touton), Bonefeld-Kurtscheid (Schlickum), Reichenstein bei Montjoie (Wirtgen), Winnigen: Rote Lei (Schlickum), Köln: Zollstock (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Hanau: Ostbahnhof-Krotzenburger Sumpfwiesen (auch → *bernhardinum*, Touton).

f. nova *valdestriatum* Touton. Randblüten aussen stark rotstreifig. **Rheinprovinz**: Wiesenrand beim Bahnhof Castellaun (Touton).

var. *bernhardinum* N. P. **Rheinprovinz**: Forsthaus Heiligenkreuz bei Bingerbrück (Touton), Niederlahnstein-Horchheimer Höhe (Touton), Küchelscheid bei Kaltenherberg, Sourbrodt, an Erddünen (Wirtgen), Winnigen: Blumslei-Rote Lei und Layer Lei, Hand bei Dellbrück (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Nassau-Dausenau (Touton), Weilburger Tal bei Dotzheim (mit amauronartigem Kopf, aber Schuppen schmal, dunkelgrau, grünlicher Rand bis mälsig flockig, dunkelgelbe, stark rotstreifige Blüten, Touton).

[var. nova *pseudobernhardinum* Touton in scheda 1915. Flockiger Schuppenrand, grünlicher Blattrücken. **Rheinprovinz**: Köln: Wiese bei der alten Ziegelei (Schlickum), ebenda Südfriedhof (Schlickum)].

[var. nova *Coloniense* Touton in scheda. Stumpfe Blätter, fast fehlende Behaarung, stark rotstreifige Randblüten. **Rheinprovinz**: Köln, ebenda (Schlickum).]

var. *plurifloccum* N. P. **Rheinprovinz**: Küchelscheid bei Kaltenherberg (= der Juraform, Wirtgen), Erddünen bei Sourbrodt (Wirtgen), Straukuhle bei Straberg (hier wie *minuticeps-vulgare*, Höppner).

var. *primarium* N. P. **Rheinprovinz**: Köln, Ödland bei Zollstock (Schlickum).

var. nova *primariiforme* Touton. Charakter des flagellare, in Hülle und Blättern wie *primarium* N. P. Hülle 11 mm lang, bis sehr breit gestutzt gerundet, Schuppen schmal, zum Teil sehr schmal, schmal grünrandig. Blätter dünn und weich, gelblich-grün, spatelig länglich und länglich, stumpf, unterseits graulich-grün bis grünlich-grau. Behaarung an Hülle und Schaft 0 oder bis mälsig. Blüten hellgelb, schwach rotstreifige Randblüten. **Rheinhausen**: Wendelsheim-Niederwiesen-Nack-Teufelsrutsch (Touton). **Hessen-Nassau**: Mosbacher Kiesgrube bei Wiesbaden, Schmidtrödter Wiesen bei Königstein (Touton).

var. nova *subrosulatum* Touton. Wie subvar. *subpilosum*, aber reichentwickelte Rosette aus kurzen, elliptisch obovaten (äussere)



bis spatelig länglichen Blättern, kürzere, dickliche, ziemlich dicht beblätterte, mit obovat länglichen Blättern besetzte Läufer, mälsig starke Rotstreifung der Randblüten. Sehr charakteristisch besonders durch die vegetative Region. **Rheinprovinz:** Hunsrück, Gammelshausen  $\rightarrow$  Laubach (Touton).

var. nova *tricholepigenes* Touton. 8 cm hoch, 1—3 Schäfte, lanzettliche, unterseits graulich-grüne, ziemlich kurze Blätter, Hülle schlank, 12 mm, bis mälsig kurzhaarig, Schuppenränder unten grünlich, nackt oder armflockig, nach oben reichflockig. Schliesst sich dem pseudobernhardinum an und scheint tricholepium  $\times$  angustius zu sein. **Rheinprovinz:** Boppard - Viesseweg - Alte Burg (Touton).

ssp. nova *subsedunensiforme* Touton. Kräftige Pflanzen mit 2—3 dicken, (10—)20—28 cm hohen Schäften. Blätter lanzettlich (bis länglich lanzettlich), gross, weich, gelblich-grün, spitz, äussere spitzlich. Hülle breit gerundet bis etwas gestutzt, 11—13 mm lang. Schuppen schmal, manche sehr schmal, lang feinspitzig, dunkelgrau, äussere unberandet, innere schmal heller berandet. Haare hell, oben etwas dunkelfüssig, an der Hülle spärlich bis kaum mälsig,  $\frac{1}{2}$ —1 mm lang, am Schaft, wenigstens in der unteren Hälfte, sehr reichlich, weiss, 3—6 mm lang, oben meist nur mälsig bis zerstreut, 1—3 mm lang, auf den Blättern reichlich, weich, 3—6 mm, an dem stielartigen Grund sehr dicht, bis 9 mm lang, seidig. Drüsen der Hülle reichlich, ziemlich lang, am Schaft oben mälsig, abwärts ziemlich rasch vermindert, einzeln noch bis zur Grenze des unteren Viertels. Flocken: Hülle dunkelgrau, Schuppenrand unten nackt, allmählich bis zur filzigen Spitze spärlich, mälsig und reichlicher flockig. Schaft grau, Blattrücken grünlich-grau bis grau. Randblüten ungestreift oder vereinzelt schwach rotstreifig. Läufer kräftig, mittellang, grossblättrig, stark behaart, daneben knospentragende Flagellen und gestielte Rosetten. Fuss der Pflanze üppig entwickelt, stark eriopod, von Flagellare-Charakter, dessen Habitus die ganze Pflanze trägt, so dass sie der var. primarium oder primariiforme nahe steht. **Hessen-Nassau:** Wispertal bei Lorch (Touton).

Anmerkung. N. P. haben in ihrer Grex *Subvirescens* (s. u.) schon Übergänge zu *pratense* untergebracht. Die von mir noch in der Grex *Vulgare* beibehaltenen oder neu eingefügten Formen könnten bei einiger Erweiterung der Grexmerkmale (also Schuppen auch schmal, Läufer kürzer und dicker, Blätter auch weich und gelblich-grün) auch dieser Grex zugeteilt werden. Noch besser erschiene mir die Konstituierung einer neuen Grex, die alle flagellare-artigen *Pilosella*-Ssp. vereinigte,\* oder einer der Grex *Subvirescens* unterzuordnenden Subgrex *Flagellarifrons*.

ssp. *stenophyllum* N. P.

var. nova *epilosum* Touton. Hülle und Schaft haarlos, Hülle ziemlich dunkelgrau mit leicht grünlichem Anflug. Randblüten ungestreift. Schaft und Läufer dünn. **Rheinprovinz:** Alte Ziegelei beim Südfriedhof Köln (Schlickum).



ssp. nova **Coloniae** Touton. Schäfte 2, dünn, 20—28 cm hoch. Blätter schmal lanzettlich wie bei voriger, hellgrün spitzlich bis sehr spitz, mukronat. Hülle 11—12 mm lang, ziemlich schmal gerundet. Schuppen schmal bis sehr schmal, langspitzig, dunkelgrau, die mittleren und inneren hellrandig. Haare an der Hülle spärlich,  $\frac{1}{2}$  mm lang, am Schaft 0, auf den Blättern kaum mälsig, sehr fein und weich, 1—2 mm lang. Drüsen der Hülle reichlich, lang, schwarz, am Schaft kurz bis ziemlich kurz, oben spärlich bis mälsig, abwärts bis zum Grunde ebenso, öfter unten eher etwas vermehrt. Flocken: Hülle dunkelgrau, Schuppenränder armflockig bis — an der Spitze — filzig, Schaft oben grauviolett, unten graulich-grün, Blattunterseite grau bis grünlich-grau. Blüten halbröhrig, Randblüten ungestreift. Läufer mittellang, schlank, entfernt beblättert. **Rheinprovinz:** Köln, Brachstellen beim Südfriedhof (Schlickum).

ssp. **indivisum** N. P.

var. nova *pilosiceps* Touton. Haare der Hülle grau, reichlich, Drüsen dazwischen spärlich oder vereinzelt. Läufer etwas kräftiger. **Hessen-Nassau:** Sonnenberg bei Wiesbaden (Touton).

var. nova *glandulosiceps* Touton. Hülle 9—10 mm lang. Schuppen äusserst schmal und fein gespitzt, haarlos, reichdrüsig. Läufer sehr fein. **Rheinprovinz:** Winnigen: Rote Lei (hier Schuppen nicht ganz so schmal und Blätter oberseits ziemlich reichborstig, evtl. subvar. nova *setosifolium* Schlickum et Touton, Schlickum), Hegerhof bei Kurtscheid (hier Blätter stumpflich, Schlickum). **Hessen-Nassau:** mit voriger (Touton).

ssp. nova **stenophylloides** Touton. Blätter wie *stenophyllum*, Schuppen schwärzlich,  $\pm$  randlos, am Rande bis mälsig flockig, reichdrüsig, haarlos, Blattrücken grünlich-grau. **Rheinhausen:** Wendelsheim-Niederwiesen-Nacker Steinbrüche-Teufelsrutsch (Touton).

## XII. **Subvirescens** N. P.

Vorbemerkung: Wenn man bei N. P. die Diagnosen von ssp. *angustus* (Grex *Vulgare*) und ssp. *subvirescens* vergleicht, sieht man, dass eigentlich der einzige wirklich durchgreifende Unterschied beim ersteren die schmalen und beim letzteren die breitleichen Schuppen sind. Selbst die Verschiedenheit der Hüllengrösse 9,5–10 und 9–9,5 mm gleicht sich bei 9,5 aus. Daraus ergibt sich schon a priori, dass hier voraussichtlich häufig Anlass zur Grenzüberschreitung, also Schwierigkeit zur Abgrenzung vorhanden sein wird. Die Grenze wird nur dann eine scharfe sein, wenn man dieses eine Merkmal für ausschlaggebend hält und gar keinen Spielraum zulässt. Das ist aber wieder nicht gut möglich, weil es in der Grex *Subvirescens* verschiedene Ssp. gibt, die wie *nigrescens* Fr. (= *pernigrescens* Zahn) bei N. P. „fast schmale“, bei Zahn schmale Schuppen, und wie *virescens* Fr. (= *pervirescens* Zahn) bei beiden Autoren schmale Schuppen haben. Das gleiche ist bei *jodolepis* Norrl. der Fall, das N. P. (pag. 774) auch zur Grex *Subvirescens* stellt. Das ist eben eine schwache Stelle in der N. P. schen Gruppierung der Ssp. in Grex. Meines Erachtens wäre es naturgemässer, die ssp. *angustus* mit



Ausschaltung der flockenrandigen var. *bernhardinum* und *plurifloccum* der *Grex Subvirescens* zuzuteilen. Jedenfalls können aber in dieser auch schmalschuppige Formen ihr Unterkommen finden, wenn sie nur grüne, ± flockenlose Schuppenränder und vorwiegend grüne Blattrücken haben.

ssp. *subvirescens* N. P.

var. *genuinum* N. P.

subvar. *pilosum* N. P. **Nördl. Baden:** Michelsberg, Grötzingen (Zahn). **Rheinpfalz:** Wachenheim (Zahn), Dürkheim-Poppental (Touton). **Rheinhessen:** Heidesheimer Höhe, Brachstelle (Touton). **Rheinprovinz:** Kreuznach-Rothenfels (Touton), Forsthaus Heiligenkreuz bei Bingerbrück (Touton), Brodenbach (hier gegen submelanops), Köln, Zollstock und Südfriedhof (hier auch → *calvescens* Schlickum). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden: Teufelsgraben (Touton), Schmidtrödter Wiesen bei Königstein (hier durch schmalere Schuppen und hellere Haare gegen *angustius*, Touton).

subvar. *calvescens* (und → dieses) N. P. **Nördl. Baden:** Nussloch (→ *epilosum*, Touton). **Rheinprovinz:** Weiler-Münsterer Berg, Bingerbrück (hier Schuppenränder stellenweise ± flockig, Touton), Kirn-Hellberg-Martinsteinst-Monzingen (stark → *Auricula*, Touton). Köln, alte Ziegelei beim Südfriedhof (→ *calvescens*, Schlickum), Ruine Nürburg bei Adenau, Hohe Eifel (Wirtgen). **Hessen-Nassau:** Dotzheim-Layenkopf-Schierstein (grössere Köpfe, fast flagellare-artig), Chausseehaus-Dotzheim, Bahnlinie, Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton).

subvar. *epilosum* N. P. **Nördl. Baden:** Bruchsal (Zahn), Nussloch (Touton). **Rheinhessen:** Heidesheim-Budenheim, am Bahndamm (Touton). **Rheinprovinz:** Budesheimer Wald-Münster bei Bingerbrück, Schloss-Thalböckelheim-Niederthaler Hof-Bahndamm-Niederhausen, Castellaun → Bell-Bucher Strasse, Boppard-Vierseenweg-Alte Burg (Touton), Höhe nordwestlich Waldkönigen bei Daun, vulkanische Eifel (gegen *Hollnickense*, Wirtgen), Hand bei Dellbrück, Brodenbach (hier gegen *vulgare subpilosum*), Försterhof bei Dieblich (ebenso), Trassgrube bei Winnigen, Waldlichtung bei Hirschwiesen, Waldweg bei Penningsfeld im Königsforst bei Köln (→ *parviflorum*, Schlickum), Kiesgrube bei Sinzig (hier gegen *angustius epilosum*, Wirtgen). **Hessen-Nassau:** Layenkopf bei Dotzheim, Chausseehaus-Dotzheim an der Bahnlinie (gegen *angustius epilosum*), Entenpfuhl-Rabengrund bei Wiesbaden (Touton), Hanau, »Mississipi« am Ostbahnhof (Touton), Limburg-Eschhofen-Runkel (Schuppen auch etwas schmal, also gegen *angustius epilosum*, Touton), Hochheim-Flörsheim (Hülle breit, 10 mm, mit sehr reichlichen und ziemlich langen, schwarzen Drüsen,



wie *subcaulescens* — *vulgare*, cf. *mein pseudacutissimum* in *scheda*, Touton).

forma nova *parviceps* Touton. Blätter spatelig länglich, sehr dünn (Schatten!), Hülle 7—8 mm, Schuppen schmal, also auch gegen *angustus*<sup>1)</sup>. **Rheinprovinz**: Penningsfeld im Königsforst bei Köln, Waldweg (Schlickum).

ssp. nova *viridiflavescens* Touton. Blätter hellgelbgrün, unterseits höchstens reichflockig, hellgrün. Grosse Köpfe mit Hüllen bis 13 mm. Schuppen schmal, sehr spitz, schwarz, grünrandig, flockenloser Rand, sehr reiche, ziemlich lange, schwarze Bedrüsung der Hülle und des oberen Schafts; Hülle mit einzelnen schwarzen Haaren, Schaft ganz armhaarig. Schwache Rotstreifung.

var. nova *majoriceps* Touton. Hülle 11—13 mm. **Hessen-Nassau**: Brachäcker südlich einer Kiesgrube bei Dotzheim (Touton).

[var. nova *minoriceps* Touton. Hülle 10 mm. Nicht im Gebiet, Vogesen: Schnierlach-Bermont-Diedolshausen (Touton)].

ssp. *turficola* N. P. **Rheinhausen**: Ockenheimer Hörnchen. **Rheinprovinz**: Morgenbachtal (Touton).

var. nova *pilosius* Touton. Reichlich dunkle Hüllenhaare. Sehr üppige Rosette mit ebensolchem Läuferwerk, daneben blühende, verästelte Flagellen mit bis 3—4 Köpfen. 5—6 zum Teil gabelige Schäfte. Vielleicht ein rückkehrender Bastard einer *Brachiatum*-Form. **Hessen-Nassau**: Sonnenberger Steinbrüche bei Wiesbaden (Touton).

var. nova *subturficola* Touton. Schuppen fast schmal. Behaarung überall kürzer. Blattrücken reichflockig bis graulich-grün. Blätter länglich spatelig bis obovat. **Hessen-Nassau**: Wispertal bei Lorch, Nassau-Jammertal-Arnstein (Touton), Chausseehaus-Dotzheim (Touton).

subvar. nova *eurycephaloides* Touton. Schäfte 1—2, dick, Hülle bis 13(—14) mm, sehr breit, starke Rotstreifung. **Rheinhausen**: Budenheimer Steinbruch (Touton), Freiweinheim-Ingelheim durch die Au (Touton).

ssp. *nigrescens* (Fr.) N. P.

var. nova *exstriatum* Touton. **Rheinprovinz**: Köln, Südfriedhof (Schlickum).

ssp. nova *subpennigrescens* Touton.

---

<sup>1)</sup> Die schmalschuppigen Formen, die hier unter der ssp. *subvirescens* erwähnt sind und gegen *angustus* weisen, können als eigene ssp. *angustifrons* zusammengefasst werden.



var. nova *acidolepis* Touton. Schäfte 2—3, (5—)8(—18) cm hoch, schlank bis dicklich. Blätter: äussere kurz obovat, rundstumpf, innere länglich bis spatelig länglich, stumpf, innerste länglich lanzettlich, spitzlich, dunkelgrün. Hülle  $9\frac{1}{2}$ —10 mm lang, gerundet bis oval, Schuppen schmal, schwarz, dunkelgrün, innere hellgrün gerandet, nadelspitz. Haare der Hülle mäfsig zahlreich,  $\frac{1}{2}$ —1 mm lang, grauschwarz mit schwarzem Fuss, am Schaft bis mäfsig, dunkel, 1—2 mm lang, auf den Blättern ziemlich reichlich, steiflich, 2—3 mm lang. Drüsen an der Hülle mäfsig bis reichlich, schwarz, mittellang, am Schaft oben reichlich, bis zum Grund noch vereinzelt. Flocken: Hülle mäfsig, Schuppenrand nackt, Stengel oben grau-violett, unten graugrün, Blattrücken grün, ± reichflockig bis höchstens graulich-grün. Starke Rotstreifung. Läufer bis ziemlich verlängert, dicklich, Blätter der Läufer bis fast zur Spitze gleichlang. **Rheinprovinz:** Köln: alte Ziegelei beim Südfriedhof (Touton).

ssp. nova *jodolepiforme* Touton. Schäfte 1(—2), ca. 25 cm hoch, sehr schlank. Blätter lanzettlich und schmal lanzettlich, spitz, etwas gelblich-grün, sehr weich. Hülle  $8\frac{1}{2}$ —10 mm lang, breit gerundet, vielschuppig. Schuppen schmal, fein- und dunkelspitzig, grünlich-grau, grünlich berandet. Haare an Hülle und Schaft 0, auf den Blättern spärlich, weich, 1— $1\frac{1}{2}$  mm lang. Drüsen kurz und ziemlich fein, an Hülle und am Schaft oben reichlich, nach abwärts noch bis zum Grunde mäfsig. Flocken sehr fein, wie mehlige, an der Hülle mäfsig bis reichlich, Schuppenrand nackt, Schaft oben violettgrau unten grüngrau. Blattrücken grünlich-grau bis graulich-grün. Randblüten stark rotstreifig. Läufer reichlich, sehr verlängert, manchmal verzweigt, schlank, auch nach Art blühender Flagellen mit einem oder dem anderen abortierten Knospenköpfchen. Die Blätter ziemlich gross, langsam dekreszierend. **Rheinprovinz:** Höhe westlich Kempenich, Hohe Eifel (Wirtgen).

ssp. nova *flagellariceps* Schlickum und Touton. Ziemlich niedrige, dickköpfige Pflanzen mit kurzen, dicklichen Läufern, reich- und hell behaarter, nur mäfsig drüsiger Hülle, 3—4 Schäfte, lanzettliche bis länglich lanzettliche Blätter. Schuppenränder nackt, Blattunterseite grün, reichflockig bis graulich-grün.

var. nova *clarius* Touton. Blätter gelblich-grün, die breit gerundete bis fast etwas gestutzte Hülle hellgrau, Blüten hellgelb, ungestreift, halbröhrig, ziemlich stark zerschlitzt. **Rheinprovinz:** Köln: Wiese bei Zollstock (Schlickum).

var. nova *obscurius* Touton. Blätter (äussere obovat spatelig, stumpf, kurz) ziemlich dunkelgrün, Hülle dunkelgrau. Blüten schmalzungig, sattgelb, rotstreifig. **Rheinprovinz:** ebenda, Ödland (Schlickum).

ssp. nova *pseudotricholepium* Touton.



**Vorbemerkung:** Unter *Grex Tricholepium* N.P. ssp. *subvirescentifolium* Touton sind die von ssp. *tricholepium* durch weniger flockige Schuppenränder und Blattunterseiten abweichenden Formen vereinigt. Geht diese Abnahme der Beflockung, die doch in so hohem Masse ein wesentliches Charakteristikum von *tricholepium* ist, noch weiter unter Beibehaltung der übrigen *Tricholepium*merkmale, so ergeben sich diejenigen Formen, die ich hier unter dieser Ssp. vereinige. Durch diese beiden neuen Ssp. hindurch geht die gleitende Reihe von der *Grex Tricholepium* zur *Grex Subvirescens* hinüber.

**Unterschiede von *tricholepium subvirescentifolium*:** Öfter etwas schmalere Hüllen (aber auch breit gerundete kommen vor), grüne, ± flockenlose (oder nur mit vereinzelt Flocken besetzte) Schuppenränder und nur graulich-grüne Blattrücken, meist dünne, weiche Blätter.

**Unterschiede von *subvirescens pilosum*:** Grössere Hülle, 11—12 mm, ± schmale Schuppen, viel reichlichere Hüllenbehaarung, heller oder dunkler, der gegenüber die Bedrüsung ganz zurücktritt. **Rheinhausen:** Budenheim (Touton). **Rheinprovinz:** Kirn-Hellberg-Martinstein-Monzingen, Boppard: Vierseenweg. **Hessen-Nassau:** Kiesgrube bei Dotzheim-Kastanienpflanzung (Touton).

ssp. nova **flagellarifrons** Touton. Schäfte 1—3, schlank bis dicklich, 23—32 cm hoch. Blätter: äussere obovat, kurz, stumpf, innere länglich-spatelig oder länglich elliptisch, stumpflich oder spitzlich, hellgrün, sehr dünn und weich. Hülle 13—14 mm lang, breit gerundet bis fast gestutzt. Schuppen breitlich bis teilweise fast breit, dunkelgrau, schmal, innen breit hellgrünrandig. Haare der Hülle reichlich bis sehr reichlich, grau bis hell, schwarz- bis dunkelfüssig, 2(—3) mm lang, am Schaft spärlich oder meist mässig, grau, 2—3 mm, auf den Blättern mässig bis ziemlich reichlich, etwas steiflich, 2—3 mm lang. Drüsen der Hülle spärlich bis mässig, am Schaft oben mässig bis reichlich, etwa bis zur Mitte noch vereinzelt. Flocken: mässig bis ziemlich reichlich, Schuppenränder nackt [bis ziemlich reichflockig ev. eigene var. *floccisquamum* T. → *tricholepium*], Schaft grau, unten graulich-grün. Blattrücken graulich-grün. Blüten hellgelb, schwach rotgestreift. Läufer sehr lang und kräftig mit grossen, fast gleichlangen oder langsam decrezierenden, obovat länglichen, stumpfen Blättern besetzt, dazwischen blühende und verzweigte Flagellen. Diese kräftig entwickelten, fast immer die Höhe der Pflanze erreichenden, gerne nach oben strebenden Läufer mit den Flagellen mit den grossen, weichen Blättern mit ihrer sehr reichlichen und langen Behaarung und die dicken, breiten, grossen, dunklen Köpfe geben dem Habitus einen ausgesprochenen Flagellare-Charakter.

var. nova **genuinum** Touton, wie vorher. **Starkenburger-Zwingenberg-Melibokus** (Touton).

subvar. **floccisquamum** Touton. Hülle mit Schuppenrändern reichflockig (→ *tricholepium*, mit voriger).



var. nova *intermedium* Touton. 16—24 cm hoch, Hülle 11 mm, schwarzgrün. Behaarung viel kürzer und schwächer. Läufer kürzer, weniger reichlich, mit kleinen Blättern. Mit voriger.

subvar. nova *obovatifolium* Touton. Blätter breit, obovat rundstumpf, spärlich behaart, Hülle sehr breit gerundet. Mit der vorigen.

subvar. nova *oblongifolium* Touton. Blätter länglich, derber, spitz. Läufer noch reduzierter. Mit der vorigen.

var. nova *subvirescentifrons* Touton. Blätter und Läufer fast wie bei *genuinum*, nicht ganz so gross und den Habitus bestimmend. Hülle nur 9—11(—12) mm lang, Schuppen fast breitlich bis breitlich. Mit der vorigen.

subvar. nova *pilosiceps* Touton. Hülle reich- aber kurzhaarig, 10—12 mm, armdrüsig, dunkelgrau bis schwärzlich-grau. Schuppen bis schmal. Mit der vorigen.

subvar. nova *glandulosiceps* Touton. Hülle schwarz, nur mit vereinzelt, dunklen Haaren, reichdrüsig, 10—11 mm, Schuppen ± schmal. Mit voriger.

subvar. nova *vulgariceps* Touton. Hülle 9—10 mm, Schuppen noch etwas breitlich, reichdrüsig, Drüsen kurz. Mit voriger.

subvar. nova *setosifrons* Touton. Wie *vulgare setosum* aber Blätter weich und dünn, unterseits bis fast grau, zumeist aber graugrün. Hülle 10 mm, hellgrau, reichflockig, Schuppenrand bis mälsigflockig. Mit der vorigen. (Alle Formen: Touton.)

ssp. nova *sublatipes* Schlickum und Touton. (= *prussicum latipes* «*Pilosella*). Breite, elliptische, stumpfe, ziemlich stark gezähnelte, oberseits graulich-grüne, unten grünlich-graue bis graue Rosettenblätter, Schaft in der Mitte gabelig, 2 köpfig. Hülle breit gerundet, 10 mm lang, dunkelgrau. Schuppen schmal, schmal hellrandig. Schaft und Hülle unbehaart, letztere und ersterer oben reichdrüsig, bis herunter noch mälsig drüsig. Blätter oberseits ziemlich reichborstlich (2—4 mm). Schuppen reichflockig, Ränder unten nackt, nach oben auch reichflockig. Stengel grau, Rotstreifung. Läufer ziemlich kurz, schlank. **Rheinprovinz**: Köln: Wiese bei Zollstock (Schlickum).

### XIII. *Megalotrichum* N. P.

ssp. *megalotrichum* N. P. Nördl. Baden: Heidelberg (N. P.).

### XV. *Minuticeps* N. P.

ssp. *minuticeps* N. P. **Rheinprovinz**: Kreuznach: hungriger Wolf und Kauzenberg-Hüffelsheimer Chaussee-Lohrer Mühle (Touton),



Hardt → Rothenfels-Stegfels (hier wie am vorhergehenden Standort eine behaartere Form, var. *pilosus* in schedis, Touton), Winnigen: Weg zur Roten Lei (Übergänge → *Vulgare parviflorum*, behaartere und kahlere an der Layer Lei und der Bimssandgrube beim Bassenheimer Weg, Schlickum), Bitburg, Eifel, Hetzhof und Condéwald (Andres), Hetzhof gegen Kinderbeuren (Andres), Adenau-Breidscheid, hohe Eifel, (f. *subexstriatum* T., Wirtgen), Köln: Wiese bei Zollstock und Brachstellen beim Südfriedhof (hier → *parvulum*, Schlickum), Rodenkirchen (Schlickum), Mühlenbusch zwischen Uckrath und Straberg und Straukuhle bei Straberg (f. *elatius* T. und → *parvulum*, Höppner), Holz-Maar bei Gillenfeld, Bengel (hier auch → *Vulgare parviflorum*, Andres), Kirschkamper Busch bei Krefeld (Höppner), Kiesgrube bei Rodenkirchen (Schlickum), zwischen Hegerhof und Wolfenacker bei Kurtscheid, Wegrand (f. *subexstriatum* T. mit grünlich-grauem Blattrücken, Schlickum). **Hessen-Nassau**: Wispertal-Sauertal bei Lorch, Nassau-Dausenau (f. *calviceps* und *pilosiceps*, Touton), Brachfeld bei Dotzheim (mit grösseren, schwarzen Drüsen, Touton).

ssp. *parvulum* N. P. **Rheinprovinz**: Kreuznach: Kauzenberg-Hüffelsheimer Chaussee-Lohrer Mühle (Touton), Weisses Kreuz bei Altenahr, Zollstock und Südfriedhof bei Köln (Schlickum), Hetzhof, Voreifel (Andres), Krefeld, Mühlenbusch zwischen Uckrath und Straberg, Hülserbruch (Höppner), Kurtscheid-Bonefeld, Wiese bei Wolfenacker-Kurtscheid (Schlickum).

ssp. *mediofurum* N. P. **Rheinprovinz**: Burg Altenahr (= Engadiner Form, s. N. P., pag 163, oben, Touton), Windesheim-Stromberg (Hülle 8 mm, sonst wie ssp. *minuticeps* = *submediofurum* in schedis, Touton.) **Hessen-Nassau**: Limburg-Linter (ziemlich nahe, Touton).

var. *nova rhenoprovinciale* Touton. Schaft 1, ungegabelt, Blattrücken meist nur grau, stärkere Rotstreifung, Läufer sehr fein. **Rheinprovinz**: Castellaun-Bucher Wald (Touton).

Anmerkung: Übergänge der ssp. *minuticeps* gegen *vulgare* bei Kreuznach am hungrigen Wolf, in der Kiesgrube bei Sinzig, zwischen Kinderbeuren und Hetzhof, bei Limburg-Linter, bei Nassau-Dausenau, in den Sonnenberger Steinbrüchen, eine dunkelköpfige Form zwischen Chausseehaus und Dotzheim. Übergang *parvulum* → *subvirescens* beim Südfriedhof Köln (Schlickum). *Minuticeps* → *parvulum*: Burg Altenahr, am Zollstock bei Köln, beim Condéwald, Straukuhle bei Straberg. *Parvulum* → *vulgare*: Südfriedhof Köln. *Minuticeps* → *Vulgare parviflorum*: Winnigen.

[ssp. *nova linariilanceolatum* Touton in schedis. **Rheinprovinz**: Mühlenbusch zwischen Uckrath und Straberg (Höppner).]

## XVI. *Inalpestre* N. P.

ssp. *inalpestre* N. P.

var. *genuinum* N. P.



subvar. *latisquamum* N. P. **Rheinprovinz:** Wolfenacker-Kurtscheid (gegen *minuticeps*, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Lurlei (N. P.), Wispertal-Sauertal (cf. ssp. *latiusculum* var. *subinalpestre* Touton, Touton).

subvar. *angustisquamum* N. P. (zusammen mit subvar. *obscurisquamum* N. P. und *angustellum* N. P. = ssp. *inalpestriforme* Zahn). **Rheinhessen:** Bahndamm Ingelheim-Heidesheim-Budenheim (Touton), Bingen (N. P.). **Rheinprovinz:** Kreuznach, Rothenfels, alter Anstieg und Kauzenberg-Hüffelsheimer Chaussee-Lohrer Mühle, Stromberg-Daxweiler und Schweppenhauser Strasse → Fustenburg (Hülle etwas dunkler, → *obscurisquamum*, Touton), Castellaun-Gammelshausen, Budesheimer Wald-Münster bei Bingerbrück, Kiesgrube bei Sinzig, Felsen über dem Teufelswehr bei Oberstein (Touton), Winnigen: Trassgrube, Wegrund und Schieferfels beim Hegerhof bei Kurtscheid (Schlickum). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden (N. P.): Sonnenberg, Parkweg-Bingert, Adamstal, Rabengrund bei Wiesbaden (Touton), Spitzer Stein bei Dotzheim, Schweizertal-Patersberg-letzte Mühle-Lurlei, Lorch-Wispertal-Sauertal, Nassau-Singhofen-Jammertal-Arnstein, Limburg-Linter (Touton).

subvar. *angustellum* N. P. **Rheinprovinz:** Trassgrube bei Winnigen (Schlickum), Köln, Südfriedhof (Blattrücken nur grau oder grünlich-grau → *vulgare*, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Sonnenberger Steinbrüche-Goldsteinbachtal bei Wiesbaden (Touton).

var. *aureum* N. P.

subvar. nova *subaureum* Touton. Wie *aureum* mit ± zahlreichen, etwas dunklen Hüllenhaaren, Schuppen schmal. **Rheinprovinz:** Stromberg → Daxweiler (Touton), Winnigen: Wiese beim Bingstal (hier  $1\frac{1}{2}$ —3 cm hoch, Schlickum).

ssp. *micradenium* N. P. **Rheingegenden:** (N. P.). **Starkenburg:** Fischbachtal bei Neuenkirchen i. Odenwald (Schlickum).

var. nova *obtusifolium* Touton. Blätter länglich bis länglich lanzettlich, stumpf. **Starkenburg:** Bickenbacher Tanne (Touton).

var. nova *nipanthocephalum* Schlickum et Touton. Hülle fast weiss oder leicht graulich-weiss, Schuppen schmal, weissfilzig, nur die unteren Teile der inneren Schuppen flockenarm bis nackt. **Rheinprovinz:** Kobern, gegenüber Dieblich (1 tiefgabliges Exemplar, Schlickum).

subvar. *pilosiceps* Schlick. et Tout. Hülle ziemlich reichhaarig und armdrüsiger. **Rheinprovinz:** Kobern: Fuss der Obernburg (Schlickum).



*ssp. balticum* N.P. **Rheinhausen:** Bingen (N.P.). **Rheinprovinz:** Koblenz: Fuss der Obernburg (Schlickum).

*ssp. nova subbalticum* Touton. Hülle weisslich-grau, Schuppen breitlich, Haare der Hülle reichlich, am Schaft zerstreut. Drüsen fast spärlich, zum Teil im Sternfilz versteckt. **Rheinhausen:** Wendelsheim-Niederwiesen-Nacker Steinbrüche-Teufelsrutsch (Touton).

[Von Pilosellaformen sind noch notiert, können aber vorläufig nicht kontrolliert werden: *Grex Vulgare, ssp. nova gracilistolonum* Touton. **Rheinprovinz:** Wegränder in Springiersbach bei Bengel (Andres). — *Ssp. vulgare* → *parvulum*. **Rheinprovinz:** Hetzhof (Andres). — *Grex Minuticeps ssp. nov. subschultesii* Tout. **Rheinprovinz:** Condelswald, Voreifel (Andres). — *Grex Vulgare*, der *ssp. hololasium* sehr nahe, eventl. als var. *calvus* Touton. **Rheinprovinz:** Waldränder bei Hetzhof, Voreifel (Andres). — *Ssp. vulgare* → *minuticeps*. **Rheinprovinz:** Straukühle bei Straberg (Höppner). — *Grex Vulgare* (oder *Latiusculum*) *ssp. nova sublatiusculum* Touton. **Rheinprovinz:** Firmenich bei Daun (Wirtgen). — *Ssp. polyxystum* N.P. var. *pleiadenium* N.P. subvar. nov. *majoriceps* Touton. **Rheinprovinz:** Heimbach, Ruhr (Wirtgen). — *Ssp. latiusculum* N.P. var. *nova griseoalbum* Tout. **Rheinprovinz:** Heimbach, Ruhr (Wirtgen). — *Ssp. vulgare* → *angustus plurifloccum*. **Rheinprovinz:** Mühlenbusch zwischen Uckrath und Straberg (Höppner). — *Ssp. tricholepium* N.P. → *ssp. hololasium* N.P. **Rheinprovinz:** Mühlenbusch zwischen Uckrath und Straberg (Höppner). — *Ssp. vulgare*, var. *subvulgare* N.P., subvar. *hirsutum* N.P. → *subvirescens* N.P. **Rheinprovinz:** Wiese bei der alten Ziegelei, Köln (Schlickum). — *Inter ssp. parviflorum, vulgare et tricholepium*. **Rheinprovinz:** Wiese bei Mariarod bei Winnigen (Schlickum). — *Ssp. vulgare* → *tricholepium*. **Rheinprovinz:** Bergabhang am Fussweg nach Neuerburg (Schlickum). — *Ssp. vulgare* → *parviflorum*. **Rheinprovinz:** Bonefeld-Kurtscheid, Strassenrand (Schlickum). — *Grex Latiusculum ssp. nov. amaurops* Schlick. et Touton. **Rheinprovinz:** Wegrand bei Kurtscheid und auf Schieferfels bei Kurtscheid (Schlickum). Im Text jetzt unter *amauron*.]

## **Hieracium Auricula** Lamk. et D C.

Vorbemerkung: Zahn hat (R. V. C. pag. 1195) die 12 Nägeli-Peterschen *Ssp.* beibehalten und noch um 2 vermehrt. In einer besonderen *Grex Micranthum* hat er das spanisch-korsische *H. micranthum* als einzige *Ssp.* der *Grex Auricula* mit den 14 *Ssp.* gegenübergestellt, was von N.P. früher als selbstständige Zwischenart — *macranthum* < *Auricula* — gedeutet war. Seine früheren Bedenken, dass die von N.P. aufgestellten *Ssp.* durch zu wenig wichtige und markante Merkmale voneinander verschieden seien, um als *Ssp.* gewertet werden zu können, hat er offenbar fallen gelassen. Sicher



ist, dass sich bei manchen Formen die Merkmale mehrerer Ssp. nebeneinander vorfinden, sich gewissermaßen einfach addieren, nicht, wie dies sonst bei Zwischenformen gewöhnlich ist, gegenseitig durchdringen.

ssp. **lampreilema** N. P. **Hessen-Nassau:** Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton).

var. nova *macracladium* Touton. Akladium 12—15 mm. Mit voriger.

ssp. **Auricula** Lamk. et D C.

var. *genuinum* N. P.

subvar. *epilosum* N. P. **Rheinpfalz:** (häufig, Zahn). **Rheinprovinz:** Castellaun, Wiese am Bahnhof und Bucher Wald, Stromberg-Neupfalz-Schöneberg (Touton), Bitburg, Eifel (Andres), Scheibiger Berg bei Hetzhof, Voreifel (Andres), Leimbach bei Kempenich auf Wiesen, Hohe Eifel (Wirtgen), Kliedbruch bei Krefeld (+ subpilosum) und Borsheim bei Viersen (Höppner), Wiesen bei Sourbrodt (Wirtgen), Hülserbruch, Weingarten, Nordeifel (Höppner), Wiese bei Hirschwiesen bei Brodenbach, Berg bei Brodenbach, Wannersköpfe bei Saffig (Schlickum), Kleinbornsbachtal bei Winnigen (Schlickum). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden, Entenpfuhl, Kastanienpflanzung und Layenkopf bei Dotzheim, Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton). **Westfalen:** Priorei bei Hagen (Fettweis).

subvar. *setosum* N. P. **Rheinprovinz:** Scheibiger Berg bei Hetzhof, Voreifel, nasse Wiesen bei Bitburg, Eifel (auch + subpilosum, Andres).

subvar. *subpilosum* N. P. **Rheinprovinz:** Münster a. St.: Huttental, Castellaun-Bucher Wald (Touton), Sumpf nordwestlich Waldkönigen bei Daun, vulkanische Eifel, Höhe bei Kempenich (Wirtgen), Bitburg, Eifel, Bengel, Eifel (—> magnum, Andres), Wiesen bei Kalterherberg (Wirtgen), Öde Wiese bei Pfennigsfeld bei Köln, Wegrund beim Eifelblick bei Kurtscheid (—> obscuriceps), Winnigen: Waldweg vor der Roten Lei (Schlickum). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden: Teufelsgraben, Chausseehaus-Fasanerie, Waldrand am Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton). **Lusus:** *chlorisquamum* Touton. Schuppen ganz hell bleichgrün bis gelblich-grün. **Hessen-Nassau:** Chausseehaus-Dotzheim an der Bahn entlang (auch von *epilosum* und *subpilosum* + *stipitatum* Touton).

subvar. *subeglandulosum* N. P. **Rheinprovinz:** Scheibiger Berg bei Hetzhof, Voreifel (Andres).

subvar. *stipitatum* N. P. **Rheinprovinz:** Castellaun - Bucher Wald, Castellaun - Gammelshausen (+ *microcephalum*), Strom-



berg-Neupfalz-Schöneberg (Touton), Langer Bruch bei Forsthaus Meisbrück, Kreis Daun (auch + subpilosum, Wirtgen), Scheibiger Berg bei Hetzhof (Andres), Wiese zwischen Bonefeld und Kurtscheid, Wegrund bei Adenau, Kleinbornsbachtal bei Winnigen und Rote Lei (+obscuriceps, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Kastanienpflanzung bei Dotzheim über Schierstein, Weilburger Tal bei Dotzheim, Waldrand Dotzheim-Frauensteiner Kopf, Wiesbaden: Chausseehaus, Klostermühle, Teufelsgraben, Kanzelbuche - Bahnhof (Touton).

subvar. *acutiusculum* N. P. **Rheinprovinz:** Gammelshausen-Laubach, Wald- und Wiesenränder (Touton).

subvar. *substriatum* N. P. **Rheinprovinz:** Castellaun-Bucher Wald, Scheibiger Berg bei Hetzhof (Andres), Büschfeld, Kreis Merzig, auf dem Bahndamm, Kempenich am Wege nach Leimbach a. d. Heide (Wirtgen). **Hessen-Nassau:** Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton).

subvar. *flocisquamum* N. P. **Nörtl. Baden:** Gornheim (Zahn). **Rheinprovinz:** Heiligenkreuz → Morgenbachtal, Castellaun, Chausseegräben an der Simmerner Strasse, Castellaun-Bucher Wald (+ substriatum, Touton), Strassenrand Bonefeld-Kurtscheid (Schlickum). **Hessen-Nassau:** Hanau, »Mississippi« am Ostbahnhof (Touton).

subvar. *microcephalum* N. P. **Rheinprovinz:** Castellaun, Chausseegräben an der Simmerner Strasse und Bucher Wald (auch + subpilosum, Touton).

subvar. *obscuriceps* N. P. **Rheingegenden:** (N. P.). **Rheinpfalz:** Forst (Zahn). **Rheinprovinz:** Gammelshausen-Laubach, Wald- und Wiesenränder (Touton), Mehren bei Daun, vulkanische Eifel (Wirtgen), Meerfeld, vulkanische Eifel (+ stipitatum, Wirtgen), Springiersbach, Voreifel (+ subpilosum, Andres), Krefeld, zwischen Lauk und Nierst (Höppner), Heimbach, Ruhr (Wirtgen), Hönningen, Ahr, Bergabhang, Wannersköpfe bei Saffig, Feldrand beim Eifelblick bei Kurtscheid (+ subpilosum, Schlickum). **Hessen-Nassau:** Wiesbaden: Teufelsgraben, Fasanerie - Chausseehaus, Sonnenberger Steinbruch, Brachfeld bei Dotzheim und Bahnlinie bis Chausseehaus (Touton). **Westfalen:** Priorei bei Hagen (Fettweis).

**Kombinationen und Zwischenformen:** stipitatum + subpilosum. **Rheinprovinz:** Gammelshausen-Laubach und die oben schon genannten. **Hessen-Nassau:** Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton).

**Ssp. Auricula** → Magnauricula subcalvum, wie vorige. Subpilosum → obscureps. **Hessen-Nassau:** Platte-Idstein (Touton). — Subpilosum



—→ *Magnauricula pilosum*. **Rheinprovinz**: Höhe westlich Kempenich (Wirtgen). — Subpilosum —→ magnum. **Rheinprovinz**: Bengel, Eifel, am Bahndamm (Andres). — Stipitatum —→ microcephalum. **Hessen-Nassau**: Waldrand, Steinbrüche, Dotzheim —→ Spitzer Stein (Touton).

ssp. *acutisquamum* N. P. **Rheinprovinz**: Castellaun, Chausseegräben an der Simmerner Strasse (auch mit einzelnen Härchen an der Hülle, var. nova subpilosum T. in sched., Touton), Büschfeld bei Merzig, auf dem Bahndamm (auch —→ *Magnauricula subcalvum*), Rödertal bei Dhronen, Hochwald (Wirtgen), Sumpf nordwestlich Waldkönigen bei Daun, vulkanische Eifel (auch eine var. pseudobscuriceps T. in sched.), Adenau, Fussweg nach der Nürburg, hohe Eifel (—→ ssp. *Auricula stipitatum*, Wirtgen), Zwalbach, Kr. Merzig (M. Dewes), Wegrand bei Adenau (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden, Kanzelbuche-Bahnholz (Touton).

ssp. *amaureilema* N. P. **Rheinprovinz**: Wegrand beim Eifelblick bei Kurtscheid (fast = N. P., Schlickum).

nova var. *striatum* Touton. Deutliche Rotspitzung. »Wohl rückkehrender Bastard *Auricula* × *Pilosella*« Zahn in sched. **Hessen-Nassau**: bei Schultesii am Wiesenrand im Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton).

ssp. *tricheilema* N. P. **Rheinprovinz**: Castellaun —→ Bell-Bucher Strasse (Touton), Wegrand beim Eifelblick bei Kurtscheid (Schlickum).

ssp. *magnum* N. P. **Rheinprovinz**: Gammelshausen —→ Laubach, Wald- und Wiesenränder (Touton), Dockweiler, Kr. Daun, beim Bahnhof (etwas —→ *Magnauricula subcalvum*, Wirtgen), Meerfeld, Kr. Daun, Sumpf nordwestlich Waldkönigen, bei Daun (Wirtgen), Kleinbornsbachtal bei Winnigen und Wegrand auf dem Berg bei Brodenbach (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden: Chausseehaus, Bahnlinie-Dotzheim, Klostermühle, Kanzelbuche-Bahnholz, Entenpfuhl-Rabengrund (Touton).

var. nova *stipitatum* Touton. Akladium 15—35 mm. **Hessen-Nassau**: Weilburger Tal bei Dotzheim, Chausseehaus (Touton).

ssp. *Magnauricula* N. P.

var. *subcalvum* N. P. **Starkenburger Wald** (Touton), Buchrainweiher bei Offenbach (Dürer). **Rheinprovinz**: Castellaun-Bucher Wald (Touton), Leimbach bei Kempenich auf Wiesen, Hohe Eifel (Wirtgen), Winnigen: Kleinbornsbachtal (Schlickum). **Hessen-Nassau**: Wiesbaden: Chausseehaus-Bahnlinie —→ Dotzheim, zwischen subcalvum und pilosum, Goldsteinbachtal, Böschung an der Klostermühle, Waldrand an der neuen Schwalbacher Chaussee (Touton).



var. *pilosum* N. P. Nur → dieses von *Auricula subpilosum*.  
**Rheinprovinz:** Höhe westlich Kempenich (Wirtgen) und von *Auricula subpilosum* + *stipitatum* → dieses. **Rheinprovinz:** Langer Bruch bei Forsthaus Meisbrück, Kreis Daun (Wirtgen). Zwischen diesem und *magnum*. **Hessen-Nassau:** Weilburger Tal bei Dotzheim (Touton).

---

Hiermit finden diese »Vorstudien« zur Gattung *Hieracium* in den Rheinlanden einen vorläufigen Abschluss. Wie es sich schon während der durch äussere Umstände über 5 Jahre hingezogenen Veröffentlichung gezeigt hat, waren durch neue Funde und neue Auffassungen in der Beurteilung der älteren »Nachträge« und »Zusätze« notwendig geworden. Ganze Florengebiete, wie z. B. die Pfalz, erfuhren durch die Mitteilungen ihrer Untersucher eine sehr dankenswerte, gründlichere Beleuchtung. Schlickum, Freiberg und Fettweis schickten z. T. noch bis vor kurzer Zeit Neufunde ein, letzterer besonders auch von *Pilosella*, die noch nicht alle durchgearbeitet und für diesen vorliegenden Teil verwendet werden konnten. Die bereits im Manuskript teilweise zusammengestellten »Nachträge und Korrekturen« sollen auch über diese Bericht erstatten und wahrscheinlich im nächsten Jahrgang dieser Jahrbücher vervollständigt erscheinen.

---